

表 3104 ヘモグロビン濃度(g/dL) 透析歴(年)別 (腹膜透析患者)

透析歴	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)	2 (0.1)	3 (0.1)	14 (0.6)	40 (1.6)	148 (6.1)	395 (16.2)	708 (29.1)	666 (27.4)	340 (14.0)	88 (3.6)	31 (1.3)	2,435 (100.0)	1,245	3,680	10.81	1.40
2年～ (%)		2 (0.1)	16 (0.8)	34 (1.6)	121 (5.8)	332 (15.8)	605 (28.8)	611 (29.1)	276 (13.1)	76 (3.6)	27 (1.3)	2,100 (100.0)	1,002	3,102	10.82	1.37
5年～ (%)			7 (0.7)	14 (1.3)	71 (6.6)	180 (16.8)	297 (27.8)	303 (28.3)	132 (12.3)	47 (4.4)	18 (1.7)	1,069 (100.0)	451	1,520	10.83	1.38
10年～ (%)			1 (0.4)	8 (3.2)	12 (4.7)	32 (12.6)	68 (26.9)	73 (28.9)	39 (15.4)	15 (5.9)	5 (2.0)	253 (100.0)	61	314	11.01	1.49
15年～ (%)					6 (9.5)	8 (12.7)	17 (27.0)	16 (25.4)	13 (20.6)	2 (3.2)	1 (1.6)	63 (100.0)	24	87	10.94	1.39
20年～ (%)						5 (31.3)	6 (37.5)	2 (12.5)	1 (6.3)	1 (6.3)	1 (6.3)	16 (100.0)	10	26	10.97	1.50
25年～ (%)				1 (11.1)	2 (22.2)	2 (22.2)	1 (11.1)	2 (22.2)		1 (11.1)		9 (100.0)	3	12	10.11	1.78
30年～ (%)					1 (20.0)			3 (60.0)	1 (20.0)			5 (100.0)	1	6	10.84	1.33
35年～ (%)			1 (50.0)					1 (50.0)				2 (100.0)		2	8.80	3.11
40年～ (%)								1 (100.0)				1 (100.0)	1	2	11.40	
合計 (%)	2 (0.0)	5 (0.1)	39 (0.7)	97 (1.6)	361 (6.1)	954 (16.0)	1,702 (28.6)	1,678 (28.2)	802 (13.5)	230 (3.9)	83 (1.4)	5,953 (100.0)	2,798	8,751	10.83	1.39
不明 (%)							1 (50.0)	1 (50.0)				2 (100.0)	16	18	11.10	0.28
記載なし (%)																
総計 (%)	2 (0.0)	5 (0.1)	39 (0.7)	97 (1.6)	361 (6.1)	954 (16.0)	1,703 (28.6)	1,679 (28.2)	802 (13.5)	230 (3.9)	83 (1.4)	5,955 (100.0)	2,814	8,769	10.83	1.39
平均		1.20	3.62	3.25	3.30	3.02	3.04	3.17	3.04	3.52	3.66	3.12	2.72	2.99		
標準偏差		1.30	5.82	4.01	4.05	3.47	3.43	3.78	3.59	3.95	4.02	3.66	3.31	3.55		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査