

表 3105 ヘモグロビン濃度(g/dL) 原疾患別（腹膜透析患者）

原疾患	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	1 (0.1)	2 (0.1)	7 (0.4)	26 (1.3)	123 (6.3)	294 (15.1)	557 (28.7)	580 (29.9)	245 (12.6)	78 (4.0)	30 (1.5)	1,943 (100.0)	887	2,830	10.85	1.36
慢性腎盂腎炎 (%)				1 (1.4)	3 (4.1)	17 (23.0)	21 (28.4)	18 (24.3)	7 (9.5)	6 (8.1)	1 (1.4)	74 (100.0)	23	97	10.84	1.37
急速進行性糸球 体腎炎 (%)				1 (2.3)	2 (4.7)	5 (11.6)	13 (30.2)	16 (37.2)	6 (14.0)			43 (100.0)	23	66	10.82	1.15
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)					3 (12.0)	6 (24.0)	4 (16.0)	7 (28.0)	3 (12.0)	2 (8.0)		25 (100.0)	2	27	10.68	1.48
その他の分類不 能の腎炎 (%)			1 (2.0)	2 (3.9)	5 (9.8)	9 (17.6)	12 (23.5)	16 (31.4)	5 (9.8)	1 (2.0)		51 (100.0)	27	78	10.47	1.41
多発性嚢胞腎 (%)			1 (0.6)	1 (0.6)	3 (1.8)	17 (10.2)	53 (31.9)	47 (28.3)	30 (18.1)	7 (4.2)	7 (4.2)	166 (100.0)	97	263	11.26	1.49
腎硬化症 (%)			2 (0.3)	8 (1.1)	38 (5.1)	133 (17.9)	228 (30.8)	204 (27.5)	94 (12.7)	25 (3.4)	9 (1.2)	741 (100.0)	354	1,095	10.80	1.28
悪性高血圧 (%)				1 (1.4)	4 (5.6)	6 (8.5)	18 (25.4)	22 (31.0)	16 (22.5)	4 (5.6)		71 (100.0)	36	107	11.07	1.31
糖尿病性腎症 (%)	1 (0.1)	2 (0.1)	18 (1.0)	27 (1.4)	125 (6.7)	317 (16.9)	534 (28.4)	523 (27.8)	245 (13.0)	63 (3.4)	23 (1.2)	1,878 (100.0)	921	2,799	10.77	1.40
SLE腎炎 (%)			1 (3.1)		3 (9.4)	10 (31.3)	9 (28.1)	6 (18.8)	3 (9.4)			32 (100.0)	14	46	10.23	1.27
アミロイド腎 (%)				1 (9.1)		2 (18.2)	2 (18.2)	2 (18.2)	4 (36.4)			11 (100.0)	4	15	10.89	1.61
痛風腎 (%)				1 (3.8)	2 (7.7)	6 (23.1)	5 (19.2)	8 (30.8)	3 (11.5)	1 (3.8)		26 (100.0)	6	32	10.64	1.36
先天性代謝異常 による腎不全 (%)				1 (8.3)	1 (8.3)	3 (25.0)		5 (41.7)		2 (16.7)		12 (100.0)	5	17	10.67	1.82
腎・尿路結核 (%)							1 (100.0)					1 (100.0)	1	2	10.60	
腎・尿路結石 (%)				1 (5.9)	1 (5.9)		6 (35.3)	2 (11.8)	5 (29.4)	2 (11.8)		17 (100.0)	4	21	11.26	1.48
腎・尿路腫瘍 (%)				1 (8.3)	1 (8.3)	1 (8.3)	2 (16.7)	3 (25.0)	2 (16.7)	1 (8.3)	1 (8.3)	12 (100.0)	2	14	11.12	2.02
閉塞性尿路障害 (%)					1 (6.7)	3 (20.0)	2 (13.3)	5 (33.3)	4 (26.7)			15 (100.0)	6	21	10.85	1.27
骨髄腫 (%)					1 (25.0)		1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)			4 (100.0)	3	7	10.60	1.98
腎形成不全 (%)			2 (4.1)		2 (4.1)	8 (16.3)	14 (28.6)	11 (22.4)	9 (18.4)	2 (4.1)	1 (2.0)	49 (100.0)	23	72	10.84	1.71
不明 (%)		1 (0.2)	5 (0.9)	17 (3.0)	30 (5.3)	82 (14.4)	170 (29.8)	147 (25.8)	85 (14.9)	27 (4.7)	6 (1.1)	570 (100.0)	272	842	10.84	1.45
再導入 (%)				2 (5.6)	1 (2.8)	5 (13.9)	9 (25.0)	10 (27.8)	5 (13.9)	3 (8.3)	1 (2.8)	36 (100.0)	19	55	11.10	1.63
その他 (%)			2 (1.1)	6 (3.4)	12 (6.7)	30 (16.9)	42 (23.6)	46 (25.8)	30 (16.9)	6 (3.4)	4 (2.2)	178 (100.0)	85	263	10.85	1.62
合計 (%)	2 (0.0)	5 (0.1)	39 (0.7)	97 (1.6)	361 (6.1)	954 (16.0)	1,703 (28.6)	1,679 (28.2)	802 (13.5)	230 (3.9)	83 (1.4)	5,955 (100.0)	2,814	8,769	10.83	1.39
記載なし (%)																
総計 (%)	2 (0.0)	5 (0.1)	39 (0.7)	97 (1.6)	361 (6.1)	954 (16.0)	1,703 (28.6)	1,679 (28.2)	802 (13.5)	230 (3.9)	83 (1.4)	5,955 (100.0)	2,814	8,769	10.83	1.39

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査