

表 3114 総コレステロール濃度(mg/dL) 治療方法別（透析患者全体）

治療方法	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析 （％）	7,130 (3.9)	20,574 (11.1)	37,237 (20.1)	43,083 (23.3)	35,120 (19.0)	22,182 (12.0)	11,275 (6.1)	5,081 (2.7)	2,087 (1.1)	1,365 (0.7)	185,134 (100.0)	63,591	248,725	155.13	35.60
血液透析濾過 （％）	1,194 (2.9)	3,692 (9.1)	7,572 (18.6)	9,444 (23.2)	8,117 (19.9)	5,507 (13.5)	2,974 (7.3)	1,392 (3.4)	532 (1.3)	326 (0.8)	40,750 (100.0)	13,026	53,776	159.19	35.71
血液濾過 （％）	2 (20.0)		2 (20.0)	1 (10.0)	4 (40.0)	1 (10.0)					10 (100.0)	6	16	140.60	43.17
血液吸着透析 （％）	30 (2.7)	107 (9.5)	199 (17.6)	254 (22.5)	225 (19.9)	169 (14.9)	90 (8.0)	35 (3.1)	16 (1.4)	6 (0.5)	1,131 (100.0)	245	1,376	160.18	35.10
在宅血液透析 （％）	1 (0.3)	8 (2.2)	35 (9.7)	58 (16.0)	87 (24.0)	80 (22.1)	44 (12.2)	24 (6.6)	13 (3.6)	12 (3.3)	362 (100.0)	193	555	181.29	37.34
腹膜透析 （％）	52 (1.1)	205 (4.5)	486 (10.6)	827 (18.0)	962 (21.0)	811 (17.7)	577 (12.6)	338 (7.4)	173 (3.8)	151 (3.3)	4,582 (100.0)	4,187	8,769	177.86	40.74
合計 （％）	8,409 (3.6)	24,586 (10.6)	45,531 (19.6)	53,667 (23.1)	44,515 (19.2)	28,750 (12.4)	14,960 (6.4)	6,870 (3.0)	2,821 (1.2)	1,860 (0.8)	231,969 (100.0)	81,248	313,217	156.35	35.90
記載なし （％）															
総計 （％）	8,409 (3.6)	24,586 (10.6)	45,531 (19.6)	53,667 (23.1)	44,515 (19.2)	28,750 (12.4)	14,960 (6.4)	6,870 (3.0)	2,821 (1.2)	1,860 (0.8)	231,969 (100.0)	81,248	313,217	156.35	35.90

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査