

表 3117 総コレステロール濃度(mg/dL) 性別 (透析患者全体)

性別	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	6,872	19,645	33,888	36,031	26,553	14,951	6,707	2,655	1,051	647	149,000	52,337	201,337	149.75	33.50
(%)	(4.6)	(13.2)	(22.7)	(24.2)	(17.8)	(10.0)	(4.5)	(1.8)	(0.7)	(0.4)	(100.0)				
女性	1,537	4,941	11,643	17,636	17,962	13,799	8,253	4,215	1,770	1,213	82,969	28,911	111,880	168.22	37.00
(%)	(1.9)	(6.0)	(14.0)	(21.3)	(21.6)	(16.6)	(9.9)	(5.1)	(2.1)	(1.5)	(100.0)				
合計	8,409	24,586	45,531	53,667	44,515	28,750	14,960	6,870	2,821	1,860	231,969	81,248	313,217	156.35	35.90
(%)	(3.6)	(10.6)	(19.6)	(23.1)	(19.2)	(12.4)	(6.4)	(3.0)	(1.2)	(0.8)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	8,409	24,586	45,531	53,667	44,515	28,750	14,960	6,870	2,821	1,860	231,969	81,248	313,217	156.35	35.90
(%)	(3.6)	(10.6)	(19.6)	(23.1)	(19.2)	(12.4)	(6.4)	(3.0)	(1.2)	(0.8)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査