

表 3139 総コレステロール濃度(mg/dL) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

性別	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	974	2,961	5,599	6,311	4,834	2,735	1,277	502	189	106	25,488	6,142	31,630	152.06	33.29
(%)	(3.8)	(11.6)	(22.0)	(24.8)	(19.0)	(10.7)	(5.0)	(2.0)	(0.7)	(0.4)	(100.0)				
女性	193	650	1,803	2,927	3,090	2,616	1,617	853	328	201	14,278	3,673	17,951	171.63	36.24
(%)	(1.4)	(4.6)	(12.6)	(20.5)	(21.6)	(18.3)	(11.3)	(6.0)	(2.3)	(1.4)	(100.0)				
合計	1,167	3,611	7,402	9,238	7,924	5,351	2,894	1,355	517	307	39,766	9,815	49,581	159.09	35.64
(%)	(2.9)	(9.1)	(18.6)	(23.2)	(19.9)	(13.5)	(7.3)	(3.4)	(1.3)	(0.8)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	1,167	3,611	7,402	9,238	7,924	5,351	2,894	1,355	517	307	39,766	9,815	49,581	159.09	35.64
(%)	(2.9)	(9.1)	(18.6)	(23.2)	(19.9)	(13.5)	(7.3)	(3.4)	(1.3)	(0.8)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査