

表 3150 総コレステロール濃度(mg/dL) 性別（腹膜透析患者）

性別	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	40	177	397	606	638	495	307	162	68	49	2,939	2,735	5,674	169.94	37.96
(%)	(1.4)	(6.0)	(13.5)	(20.6)	(21.7)	(16.8)	(10.4)	(5.5)	(2.3)	(1.7)	(100.0)				
女性	12	28	89	221	324	316	270	176	105	102	1,643	1,452	3,095	192.02	41.70
(%)	(0.7)	(1.7)	(5.4)	(13.5)	(19.7)	(19.2)	(16.4)	(10.7)	(6.4)	(6.2)	(100.0)				
合計	52	205	486	827	962	811	577	338	173	151	4,582	4,187	8,769	177.86	40.74
(%)	(1.1)	(4.5)	(10.6)	(18.0)	(21.0)	(17.7)	(12.6)	(7.4)	(3.8)	(3.3)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	52	205	486	827	962	811	577	338	173	151	4,582	4,187	8,769	177.86	40.74
(%)	(1.1)	(4.5)	(10.6)	(18.0)	(21.0)	(17.7)	(12.6)	(7.4)	(3.8)	(3.3)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査