

表 3161 HDL-C濃度(mg/dL) 治療方法別（透析患者全体）

| 治療方法          | 20未満         | 20～             | 30～              | 40～              | 50～              | 60～              | 70～             | 80～            | 90～            | 100～           | 合計                 | 記載なし   | 総計      | 平均    | 標準偏差  |
|---------------|--------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------|---------|-------|-------|
| 施設血液透析<br>（％） | 735<br>(0.4) | 14,205<br>(8.3) | 41,200<br>(24.0) | 45,715<br>(26.6) | 33,259<br>(19.4) | 19,140<br>(11.1) | 9,447<br>(5.5)  | 4,385<br>(2.6) | 1,955<br>(1.1) | 1,816<br>(1.1) | 171,857<br>(100.0) | 76,868 | 248,725 | 48.48 | 16.63 |
| 血液透析濾過<br>（％） | 118<br>(0.3) | 2,502<br>(6.4)  | 8,168<br>(20.9)  | 9,930<br>(25.4)  | 8,191<br>(20.9)  | 5,035<br>(12.9)  | 2,745<br>(7.0)  | 1,324<br>(3.4) | 625<br>(1.6)   | 498<br>(1.3)   | 39,136<br>(100.0)  | 14,640 | 53,776  | 50.85 | 17.19 |
| 血液濾過<br>（％）   |              | 3<br>(37.5)     | 2<br>(25.0)      | 2<br>(25.0)      | 1<br>(12.5)      |                  |                 |                |                |                | 8<br>(100.0)       | 8      | 16      | 37.00 | 13.10 |
| 血液吸着透析<br>（％） |              | 59<br>(5.6)     | 185<br>(17.7)    | 282<br>(27.0)    | 221<br>(21.1)    | 155<br>(14.8)    | 84<br>(8.0)     | 35<br>(3.3)    | 13<br>(1.2)    | 11<br>(1.1)    | 1,045<br>(100.0)   | 331    | 1,376   | 51.83 | 16.69 |
| 在宅血液透析<br>（％） |              | 14<br>(3.9)     | 42<br>(11.7)     | 83<br>(23.1)     | 81<br>(22.5)     | 69<br>(19.2)     | 29<br>(8.1)     | 14<br>(3.9)    | 9<br>(2.5)     | 19<br>(5.3)    | 360<br>(100.0)     | 195    | 555     | 57.55 | 20.22 |
| 腹膜透析<br>（％）   | 18<br>(0.4)  | 315<br>(7.4)    | 980<br>(22.9)    | 1,089<br>(25.5)  | 823<br>(19.3)    | 541<br>(12.7)    | 274<br>(6.4)    | 130<br>(3.0)   | 54<br>(1.3)    | 49<br>(1.1)    | 4,273<br>(100.0)   | 4,496  | 8,769   | 49.69 | 17.18 |
| 合計<br>（％）     | 871<br>(0.4) | 17,098<br>(7.9) | 50,577<br>(23.3) | 57,101<br>(26.4) | 42,576<br>(19.6) | 24,940<br>(11.5) | 12,579<br>(5.8) | 5,888<br>(2.7) | 2,656<br>(1.2) | 2,393<br>(1.1) | 216,679<br>(100.0) | 96,538 | 313,217 | 48.96 | 16.78 |
| 記載なし<br>（％）   |              |                 |                  |                  |                  |                  |                 |                |                |                |                    |        |         |       |       |
| 総計<br>（％）     | 871<br>(0.4) | 17,098<br>(7.9) | 50,577<br>(23.3) | 57,101<br>(26.4) | 42,576<br>(19.6) | 24,940<br>(11.5) | 12,579<br>(5.8) | 5,888<br>(2.7) | 2,656<br>(1.2) | 2,393<br>(1.1) | 216,679<br>(100.0) | 96,538 | 313,217 | 48.96 | 16.78 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査