

表 3164 HDL-C濃度(mg/dL) 性別 (透析患者全体)

性別	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	640	13,507	36,971	37,738	25,460	13,596	6,234	2,838	1,280	1,195	139,459	61,878	201,337	46.78	15.97
(%)	(0.5)	(9.7)	(26.5)	(27.1)	(18.3)	(9.7)	(4.5)	(2.0)	(0.9)	(0.9)	(100.0)				
女性	231	3,591	13,606	19,363	17,116	11,344	6,345	3,050	1,376	1,198	77,220	34,660	111,880	52.89	17.47
(%)	(0.3)	(4.7)	(17.6)	(25.1)	(22.2)	(14.7)	(8.2)	(3.9)	(1.8)	(1.6)	(100.0)				
合計	871	17,098	50,577	57,101	42,576	24,940	12,579	5,888	2,656	2,393	216,679	96,538	313,217	48.96	16.78
(%)	(0.4)	(7.9)	(23.3)	(26.4)	(19.6)	(11.5)	(5.8)	(2.7)	(1.2)	(1.1)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	871	17,098	50,577	57,101	42,576	24,940	12,579	5,888	2,656	2,393	216,679	96,538	313,217	48.96	16.78
(%)	(0.4)	(7.9)	(23.3)	(26.4)	(19.6)	(11.5)	(5.8)	(2.7)	(1.2)	(1.1)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査