

表 3174 HDL-C濃度(mg/dL) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

性別	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	514	10,852	28,851	29,038	19,127	10,017	4,563	2,067	934	899	106,862	37,578	144,440	46.38	15.88
(%)	(0.5)	(10.2)	(27.0)	(27.2)	(17.9)	(9.4)	(4.3)	(1.9)	(0.9)	(0.8)	(100.0)				
女性	185	2,917	10,814	14,920	12,894	8,386	4,491	2,146	935	856	58,544	20,868	79,412	52.23	17.31
(%)	(0.3)	(5.0)	(18.5)	(25.5)	(22.0)	(14.3)	(7.7)	(3.7)	(1.6)	(1.5)	(100.0)				
合計	699	13,769	39,665	43,958	32,021	18,403	9,054	4,213	1,869	1,755	165,406	58,446	223,852	48.45	16.63
(%)	(0.4)	(8.3)	(24.0)	(26.6)	(19.4)	(11.1)	(5.5)	(2.5)	(1.1)	(1.1)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	699	13,769	39,665	43,958	32,021	18,403	9,054	4,213	1,869	1,755	165,406	58,446	223,852	48.45	16.63
(%)	(0.4)	(8.3)	(24.0)	(26.6)	(19.4)	(11.1)	(5.5)	(2.5)	(1.1)	(1.1)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査