

表 3177 HDL-C濃度(mg/dL) 原疾患別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

原疾患	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 （％）	132 (0.3)	2,686 (5.7)	9,506 (20.1)	12,255 (25.9)	10,114 (21.4)	6,401 (13.5)	3,298 (7.0)	1,596 (3.4)	685 (1.4)	625 (1.3)	47,298 (100.0)	16,176	63,474	51.21	17.03
慢性腎盂腎炎 （％）	6 (0.4)	64 (4.3)	278 (18.5)	361 (24.1)	329 (21.9)	215 (14.3)	139 (9.3)	61 (4.1)	27 (1.8)	19 (1.3)	1,499 (100.0)	541	2,040	52.78	17.21
急速進行性糸球 体腎炎 （％）	6 (0.5)	43 (3.3)	202 (15.4)	295 (22.4)	289 (22.0)	219 (16.7)	108 (8.2)	78 (5.9)	40 (3.0)	35 (2.7)	1,315 (100.0)	456	1,771	56.06	19.28
妊娠腎/妊娠中毒 症 （％）	1 (0.1)	23 (3.0)	114 (15.0)	169 (22.3)	179 (23.6)	128 (16.9)	77 (10.1)	43 (5.7)	15 (2.0)	10 (1.3)	759 (100.0)	222	981	55.19	16.59
その他の分類不 能の腎炎 （％）		37 (5.2)	138 (19.4)	200 (28.1)	143 (20.1)	108 (15.2)	47 (6.6)	20 (2.8)	14 (2.0)	5 (0.7)	712 (100.0)	217	929	51.02	15.79
多発性嚢胞腎 （％）	14 (0.2)	336 (5.5)	1,200 (19.7)	1,670 (27.5)	1,375 (22.6)	771 (12.7)	400 (6.6)	173 (2.8)	73 (1.2)	66 (1.1)	6,078 (100.0)	1,938	8,016	50.59	16.10
腎硬化症 （％）	57 (0.4)	1,190 (7.3)	3,786 (23.3)	4,545 (27.9)	3,263 (20.1)	1,867 (11.5)	868 (5.3)	386 (2.4)	151 (0.9)	150 (0.9)	16,263 (100.0)	5,744	22,007	48.58	15.98
悪性高血圧 （％）	6 (0.4)	87 (6.3)	304 (22.0)	392 (28.4)	284 (20.6)	157 (11.4)	74 (5.4)	48 (3.5)	13 (0.9)	15 (1.1)	1,380 (100.0)	481	1,861	49.50	16.75
糖尿病性腎症 （％）	353 (0.5)	7,672 (11.6)	18,959 (28.7)	17,727 (26.9)	11,159 (16.9)	5,495 (8.3)	2,500 (3.8)	1,098 (1.7)	495 (0.8)	534 (0.8)	65,992 (100.0)	23,434	89,426	45.26	15.69
SLE腎炎 （％）	3 (0.3)	47 (4.2)	152 (13.6)	253 (22.7)	246 (22.0)	177 (15.9)	109 (9.8)	72 (6.5)	39 (3.5)	18 (1.6)	1,116 (100.0)	388	1,504	56.17	18.75
アミロイド腎 （％）		9 (3.9)	22 (9.5)	59 (25.5)	53 (22.9)	45 (19.5)	22 (9.5)	8 (3.5)	8 (3.5)	5 (2.2)	231 (100.0)	83	314	56.68	20.25
痛風腎 （％）	4 (0.7)	41 (6.9)	146 (24.5)	154 (25.8)	115 (19.3)	76 (12.7)	31 (5.2)	15 (2.5)	4 (0.7)	11 (1.8)	597 (100.0)	181	778	49.14	18.03
先天性代謝異常 による腎不全 （％）	2 (1.6)	7 (5.7)	30 (24.6)	24 (19.7)	24 (19.7)	20 (16.4)	9 (7.4)	3 (2.5)		3 (2.5)	122 (100.0)	51	173	50.40	17.72
腎・尿路結核 （％）	1 (0.9)	5 (4.5)	20 (18.0)	30 (27.0)	21 (18.9)	20 (18.0)	6 (5.4)	3 (2.7)	3 (2.7)	2 (1.8)	111 (100.0)	30	141	52.25	18.57
腎・尿路結石 （％）	1 (0.3)	15 (4.8)	59 (18.7)	102 (32.4)	60 (19.0)	43 (13.7)	22 (7.0)	5 (1.6)	5 (1.6)	3 (1.0)	315 (100.0)	106	421	50.37	16.01
腎・尿路腫瘍 （％）	5 (1.0)	38 (7.3)	122 (23.3)	149 (28.4)	111 (21.2)	53 (10.1)	24 (4.6)	16 (3.1)	2 (0.4)	4 (0.8)	524 (100.0)	154	678	48.23	17.16
閉塞性尿路障害 （％）	1 (0.3)	8 (2.1)	72 (19.1)	107 (28.4)	84 (22.3)	52 (13.8)	30 (8.0)	13 (3.4)	3 (0.8)	7 (1.9)	377 (100.0)	117	494	52.93	18.69
骨髄腫 （％）	2 (1.5)	12 (9.0)	27 (20.3)	31 (23.3)	24 (18.0)	19 (14.3)	10 (7.5)	3 (2.3)	2 (1.5)	3 (2.3)	133 (100.0)	57	190	50.26	18.91
腎形成不全 （％）		16 (5.2)	62 (20.1)	75 (24.3)	70 (22.7)	49 (15.9)	21 (6.8)	12 (3.9)	1 (0.3)	3 (1.0)	309 (100.0)	91	400	51.13	15.57
不明 （％）	81 (0.5)	1,082 (7.2)	3,379 (22.4)	4,045 (26.8)	3,061 (20.3)	1,787 (11.8)	899 (6.0)	389 (2.6)	201 (1.3)	165 (1.1)	15,089 (100.0)	6,087	21,176	49.35	16.67
再導入 （％）	4 (0.4)	55 (5.4)	212 (20.7)	267 (26.0)	205 (20.0)	136 (13.3)	63 (6.1)	45 (4.4)	17 (1.7)	22 (2.1)	1,026 (100.0)	330	1,356	51.81	18.30
その他 （％）	20 (0.5)	296 (7.1)	875 (21.1)	1,047 (25.2)	811 (19.5)	563 (13.5)	297 (7.1)	126 (3.0)	71 (1.7)	50 (1.2)	4,156 (100.0)	1,559	5,715	50.51	17.35
合計 （％）	699 (0.4)	13,769 (8.3)	39,665 (24.0)	43,957 (26.6)	32,020 (19.4)	18,401 (11.1)	9,054 (5.5)	4,213 (2.5)	1,869 (1.1)	1,755 (1.1)	165,402 (100.0)	58,443	223,845	48.45	16.63
記載なし （％）				1 (25.0)	1 (25.0)	2 (50.0)					4 (100.0)	3	7	55.00	9.13
総計 （％）	699 (0.4)	13,769 (8.3)	39,665 (24.0)	43,958 (26.6)	32,021 (19.4)	18,403 (11.1)	9,054 (5.5)	4,213 (2.5)	1,869 (1.1)	1,755 (1.1)	165,406 (100.0)	58,446	223,852	48.45	16.63

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査