

表 3196 HDL-C濃度(mg/dL) 透析歴(年)別 (腹膜透析患者)

透析歴	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)	3 (0.2)	93 (5.5)	357 (21.0)	441 (26.0)	355 (20.9)	225 (13.3)	110 (6.5)	63 (3.7)	24 (1.4)	26 (1.5)	1,697 (100.0)	1,983	3,680	51.24	17.54
2年～ (%)	5 (0.3)	131 (8.6)	367 (24.1)	380 (25.0)	268 (17.6)	195 (12.8)	99 (6.5)	48 (3.2)	17 (1.1)	12 (0.8)	1,522 (100.0)	1,580	3,102	48.97	17.08
5年～ (%)	7 (0.9)	72 (9.1)	177 (22.5)	200 (25.4)	147 (18.7)	91 (11.5)	57 (7.2)	17 (2.2)	11 (1.4)	9 (1.1)	788 (100.0)	732	1,520	48.97	16.93
10年～ (%)	1 (0.5)	15 (7.9)	58 (30.7)	44 (23.3)	37 (19.6)	23 (12.2)	6 (3.2)	2 (1.1)	1 (0.5)	2 (1.1)	189 (100.0)	125	314	46.27	15.74
15年～ (%)	1 (2.1)	3 (6.3)	11 (22.9)	13 (27.1)	13 (27.1)	4 (8.3)	2 (4.2)		1 (2.1)		48 (100.0)	39	87	47.13	14.42
20年～ (%)			5 (45.5)	3 (27.3)		3 (27.3)					11 (100.0)	15	26	46.36	12.52
25年～ (%)		1 (14.3)	2 (28.6)	2 (28.6)	2 (28.6)						7 (100.0)	5	12	41.14	9.62
30年～ (%)	1 (25.0)		1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)						4 (100.0)	2	6	38.75	17.27
35年～ (%)			1 (100.0)								1 (100.0)	1	2	37.00	
40年～ (%)			1 (100.0)								1 (100.0)	1	2	33.00	
合計 (%)	18 (0.4)	315 (7.4)	980 (23.0)	1,084 (25.4)	823 (19.3)	541 (12.7)	274 (6.4)	130 (3.0)	54 (1.3)	49 (1.1)	4,268 (100.0)	4,483	8,751	49.69	17.18
不明 (%)				5 (100.0)							5 (100.0)	13	18	42.20	1.30
記載なし (%)															
総計 (%)	18 (0.4)	315 (7.4)	980 (22.9)	1,089 (25.5)	823 (19.3)	541 (12.7)	274 (6.4)	130 (3.0)	54 (1.3)	49 (1.1)	4,273 (100.0)	4,496	8,769	49.69	17.18
平均	6.56	3.62	3.53	3.13	3.16	3.03	2.76	2.18	2.93	2.61	3.20	2.79	2.99		
標準偏差	7.13	3.42	4.14	3.67	3.72	3.42	2.92	2.45	3.12	3.19	3.69	3.40	3.55		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査