

表 3204 Non-HDL-C濃度(mg/dL) 治療方法別（透析患者全体）

| 治療方法          | 50未満           | 50～             | 70～              | 90～              | 110～             | 130～             | 150～            | 170～           | 190～           | 210～           | 合計                 | 記載なし    | 総計      | 平均     | 標準偏差  |
|---------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------|---------|--------|-------|
| 施設血液透析<br>（％） | 2,968<br>(2.0) | 14,263<br>(9.5) | 31,703<br>(21.1) | 37,507<br>(25.0) | 29,991<br>(20.0) | 18,178<br>(12.1) | 9,031<br>(6.0)  | 3,861<br>(2.6) | 1,537<br>(1.0) | 989<br>(0.7)   | 150,028<br>(100.0) | 98,697  | 248,725 | 106.66 | 33.27 |
| 血液透析濾過<br>（％） | 549<br>(1.6)   | 2,952<br>(8.6)  | 6,931<br>(20.3)  | 8,534<br>(24.9)  | 7,114<br>(20.8)  | 4,337<br>(12.7)  | 2,277<br>(6.7)  | 963<br>(2.8)   | 377<br>(1.1)   | 177<br>(0.5)   | 34,211<br>(100.0)  | 19,565  | 53,776  | 108.29 | 32.90 |
| 血液濾過<br>（％）   |                | 1<br>(14.3)     | 1<br>(14.3)      | 2<br>(28.6)      | 1<br>(14.3)      | 2<br>(28.6)      |                 |                |                |                | 7<br>(100.0)       | 9       | 16      | 105.00 | 34.90 |
| 血液吸着透析<br>（％） | 12<br>(1.3)    | 100<br>(10.5)   | 175<br>(18.3)    | 227<br>(23.8)    | 204<br>(21.4)    | 132<br>(13.8)    | 61<br>(6.4)     | 28<br>(2.9)    | 11<br>(1.2)    | 5<br>(0.5)     | 955<br>(100.0)     | 421     | 1,376   | 108.67 | 33.03 |
| 在宅血液透析<br>（％） | 2<br>(0.6)     | 8<br>(2.6)      | 31<br>(10.1)     | 72<br>(23.4)     | 75<br>(24.4)     | 59<br>(19.2)     | 40<br>(13.0)    | 14<br>(4.5)    | 2<br>(0.6)     | 5<br>(1.6)     | 308<br>(100.0)     | 247     | 555     | 121.89 | 32.39 |
| 腹膜透析<br>（％）   | 18<br>(0.5)    | 128<br>(3.6)    | 367<br>(10.3)    | 690<br>(19.3)    | 827<br>(23.1)    | 618<br>(17.3)    | 463<br>(12.9)   | 258<br>(7.2)   | 119<br>(3.3)   | 90<br>(2.5)    | 3,578<br>(100.0)   | 5,191   | 8,769   | 127.79 | 37.77 |
| 合計<br>（％）     | 3,549<br>(1.9) | 17,452<br>(9.2) | 39,208<br>(20.7) | 47,032<br>(24.9) | 38,212<br>(20.2) | 23,326<br>(12.3) | 11,872<br>(6.3) | 5,124<br>(2.7) | 2,046<br>(1.1) | 1,266<br>(0.7) | 189,087<br>(100.0) | 124,130 | 313,217 | 107.39 | 33.42 |
| 記載なし<br>（％）   |                |                 |                  |                  |                  |                  |                 |                |                |                |                    |         |         |        |       |
| 総計<br>（％）     | 3,549<br>(1.9) | 17,452<br>(9.2) | 39,208<br>(20.7) | 47,032<br>(24.9) | 38,212<br>(20.2) | 23,326<br>(12.3) | 11,872<br>(6.3) | 5,124<br>(2.7) | 2,046<br>(1.1) | 1,266<br>(0.7) | 189,087<br>(100.0) | 124,130 | 313,217 | 107.39 | 33.42 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。  
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2015年調査