

表 3207 Non-HDL-C濃度(mg/dL) 性別（透析患者全体）

性別	50未満	50～	70～	90～	110～	130～	150～	170～	190～	210～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	2,844	13,655	28,399	30,764	22,910	12,834	6,217	2,461	985	550	121,619	79,718	201,337	102.97	32.25
(%)	(2.3)	(11.2)	(23.4)	(25.3)	(18.8)	(10.6)	(5.1)	(2.0)	(0.8)	(0.5)	(100.0)				
女性	705	3,797	10,809	16,268	15,302	10,492	5,655	2,663	1,061	716	67,468	44,412	111,880	115.35	34.01
(%)	(1.0)	(5.6)	(16.0)	(24.1)	(22.7)	(15.6)	(8.4)	(3.9)	(1.6)	(1.1)	(100.0)				
合計	3,549	17,452	39,208	47,032	38,212	23,326	11,872	5,124	2,046	1,266	189,087	124,130	313,217	107.39	33.42
(%)	(1.9)	(9.2)	(20.7)	(24.9)	(20.2)	(12.3)	(6.3)	(2.7)	(1.1)	(0.7)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	3,549	17,452	39,208	47,032	38,212	23,326	11,872	5,124	2,046	1,266	189,087	124,130	313,217	107.39	33.42
(%)	(1.9)	(9.2)	(20.7)	(24.9)	(20.2)	(12.3)	(6.3)	(2.7)	(1.1)	(0.7)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査