

表 3216 Non-HDL-C濃度(mg/dL) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

| 性別          | 50未満           | 50～              | 70～              | 90～              | 110～             | 130～             | 150～           | 170～           | 190～           | 210～         | 合計                 | 記載なし   | 総計      | 平均     | 標準偏差  |
|-------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|--------|---------|--------|-------|
| 男性<br>(%)   | 2,257<br>(2.4) | 10,754<br>(11.6) | 22,114<br>(23.8) | 23,603<br>(25.4) | 17,330<br>(18.6) | 9,612<br>(10.3)  | 4,516<br>(4.9) | 1,750<br>(1.9) | 715<br>(0.8)   | 395<br>(0.4) | 93,046<br>(100.0)  | 51,394 | 144,440 | 102.20 | 31.95 |
| 女性<br>(%)   | 577<br>(1.1)   | 3,037<br>(5.9)   | 8,428<br>(16.4)  | 12,507<br>(24.4) | 11,517<br>(22.5) | 7,832<br>(15.3)  | 4,134<br>(8.1) | 1,939<br>(3.8) | 750<br>(1.5)   | 525<br>(1.0) | 51,246<br>(100.0)  | 28,166 | 79,412  | 114.47 | 33.91 |
| 合計<br>(%)   | 2,834<br>(2.0) | 13,791<br>(9.6)  | 30,542<br>(21.2) | 36,110<br>(25.0) | 28,847<br>(20.0) | 17,444<br>(12.1) | 8,650<br>(6.0) | 3,689<br>(2.6) | 1,465<br>(1.0) | 920<br>(0.6) | 144,292<br>(100.0) | 79,560 | 223,852 | 106.56 | 33.18 |
| 記載なし<br>(%) |                |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |              |                    |        |         |        |       |
| 総計<br>(%)   | 2,834<br>(2.0) | 13,791<br>(9.6)  | 30,542<br>(21.2) | 36,110<br>(25.0) | 28,847<br>(20.0) | 17,444<br>(12.1) | 8,650<br>(6.0) | 3,689<br>(2.6) | 1,465<br>(1.0) | 920<br>(0.6) | 144,292<br>(100.0) | 79,560 | 223,852 | 106.56 | 33.18 |

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査