

表 3217 Non-HDL-C濃度(mg/dL) 年齢(歳)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

年齢	50未満	50～	70～	90～	110～	130～	150～	170～	190～	210～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)			3 (50.0)	2 (33.3)	1 (16.7)						6 (100.0)	4	10	91.67	16.63
15歳～ (%)	8 (2.4)	37 (10.9)	88 (26.0)	89 (26.3)	63 (18.6)	29 (8.6)	14 (4.1)	7 (2.1)	2 (0.6)	1 (0.3)	338 (100.0)	239	577	100.90	32.61
30歳～ (%)	77 (1.3)	491 (8.5)	1,096 (18.9)	1,427 (24.6)	1,212 (20.9)	748 (12.9)	424 (7.3)	191 (3.3)	68 (1.2)	57 (1.0)	5,791 (100.0)	3,213	9,004	110.42	34.50
45歳～ (%)	445 (1.8)	1,994 (8.2)	4,552 (18.7)	5,791 (23.8)	4,974 (20.4)	3,387 (13.9)	1,840 (7.6)	808 (3.3)	340 (1.4)	218 (0.9)	24,349 (100.0)	13,221	37,570	110.80	34.75
60歳～ (%)	1,329 (2.0)	6,224 (9.5)	13,689 (20.9)	16,175 (24.7)	13,156 (20.1)	8,082 (12.3)	3,969 (6.1)	1,749 (2.7)	676 (1.0)	412 (0.6)	65,461 (100.0)	35,481	100,942	106.85	33.36
75歳～ (%)	934 (2.0)	4,757 (10.4)	10,501 (22.9)	11,869 (25.9)	8,999 (19.7)	4,923 (10.8)	2,304 (5.0)	891 (1.9)	361 (0.8)	225 (0.5)	45,764 (100.0)	25,801	71,565	103.73	31.75
90歳～ (%)	41 (1.6)	288 (11.2)	613 (23.7)	756 (29.3)	442 (17.1)	275 (10.7)	99 (3.8)	43 (1.7)	18 (0.7)	7 (0.3)	2,582 (100.0)	1,598	4,180	101.59	29.90
合計 (%)	2,834 (2.0)	13,791 (9.6)	30,542 (21.2)	36,109 (25.0)	28,847 (20.0)	17,444 (12.1)	8,650 (6.0)	3,689 (2.6)	1,465 (1.0)	920 (0.6)	144,291 (100.0)	79,557	223,848	106.56	33.18
不明 (%)				1 (100.0)							1 (100.0)	2	3	100.00	
記載なし (%)												1	1		
総計 (%)	2,834 (2.0)	13,791 (9.6)	30,542 (21.2)	36,110 (25.0)	28,847 (20.0)	17,444 (12.1)	8,650 (6.0)	3,689 (2.6)	1,465 (1.0)	920 (0.6)	144,292 (100.0)	79,560	223,852	106.56	33.18
平均	69.10	69.39	69.28	68.84	68.18	67.36	66.55	65.95	66.04	65.57	68.42	68.61	68.49		
標準偏差	11.71	12.06	12.18	12.31	12.23	12.17	12.27	12.15	12.24	12.47	12.24	12.37	12.29		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査