

表 3220 Non-HDL-C濃度(mg/dL) 医療機関別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

医療機関	50未満	50～	70～	90～	110～	130～	150～	170～	190～	210～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学	7	16	24	32	30	18	9	4	4	3	147	261	408	108.97	39.42
(%)	(4.8)	(10.9)	(16.3)	(21.8)	(20.4)	(12.2)	(6.1)	(2.7)	(2.7)	(2.0)	(100.0)				
私立大学	26	79	159	192	158	92	36	17	10	7	776	720	1,496	104.80	34.74
(%)	(3.4)	(10.2)	(20.5)	(24.7)	(20.4)	(11.9)	(4.6)	(2.2)	(1.3)	(0.9)	(100.0)				
国立	10	21	41	50	42	25	13	5	4		211	304	515	104.75	33.86
(%)	(4.7)	(10.0)	(19.4)	(23.7)	(19.9)	(11.8)	(6.2)	(2.4)	(1.9)		(100.0)				
県市町村立	177	990	1,879	2,045	1,362	829	429	175	68	42	7,996	4,974	12,970	102.55	32.72
(%)	(2.2)	(12.4)	(23.5)	(25.6)	(17.0)	(10.4)	(5.4)	(2.2)	(0.9)	(0.5)	(100.0)				
社会保険	42	136	376	401	311	194	93	61	18	6	1,638	1,037	2,675	106.26	33.79
(%)	(2.6)	(8.3)	(23.0)	(24.5)	(19.0)	(11.8)	(5.7)	(3.7)	(1.1)	(0.4)	(100.0)				
厚生連	105	470	1,004	1,199	973	557	266	138	52	38	4,802	1,621	6,423	106.49	33.98
(%)	(2.2)	(9.8)	(20.9)	(25.0)	(20.3)	(11.6)	(5.5)	(2.9)	(1.1)	(0.8)	(100.0)				
その他公的	101	416	976	1,096	833	522	252	105	31	27	4,359	2,557	6,916	105.29	32.95
(%)	(2.3)	(9.5)	(22.4)	(25.1)	(19.1)	(12.0)	(5.8)	(2.4)	(0.7)	(0.6)	(100.0)				
私立総合	99	369	771	857	613	391	191	72	48	16	3,427	1,362	4,789	103.97	33.72
(%)	(2.9)	(10.8)	(22.5)	(25.0)	(17.9)	(11.4)	(5.6)	(2.1)	(1.4)	(0.5)	(100.0)				
私立	1,046	4,299	8,976	10,549	8,159	5,011	2,517	1,074	482	333	42,446	24,151	66,597	106.02	34.22
(%)	(2.5)	(10.1)	(21.1)	(24.9)	(19.2)	(11.8)	(5.9)	(2.5)	(1.1)	(0.8)	(100.0)				
私立診療所	1,221	6,995	16,336	19,689	16,366	9,805	4,844	2,038	748	448	78,490	42,573	121,063	107.47	32.51
(%)	(1.6)	(8.9)	(20.8)	(25.1)	(20.9)	(12.5)	(6.2)	(2.6)	(1.0)	(0.6)	(100.0)				
総計	2,834	13,791	30,542	36,110	28,847	17,444	8,650	3,689	1,465	920	144,292	79,560	223,852	106.56	33.18
(%)	(2.0)	(9.6)	(21.2)	(25.0)	(20.0)	(12.1)	(6.0)	(2.6)	(1.0)	(0.6)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査