

表 3225 Non-HDL-C濃度(mg/dL) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

性別	50未満	50～	70～	90～	110～	130～	150～	170～	190～	210～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	448	2,298	4,930	5,465	4,108	2,303	1,153	467	171	73	21,416	10,214	31,630	103.72	31.99
(%)	(2.1)	(10.7)	(23.0)	(25.5)	(19.2)	(10.8)	(5.4)	(2.2)	(0.8)	(0.3)	(100.0)				
女性	90	588	1,844	2,865	2,828	1,914	1,063	460	190	94	11,936	6,015	17,951	116.18	32.77
(%)	(0.8)	(4.9)	(15.4)	(24.0)	(23.7)	(16.0)	(8.9)	(3.9)	(1.6)	(0.8)	(100.0)				
合計	538	2,886	6,774	8,330	6,936	4,217	2,216	927	361	167	33,352	16,229	49,581	108.18	32.81
(%)	(1.6)	(8.7)	(20.3)	(25.0)	(20.8)	(12.6)	(6.6)	(2.8)	(1.1)	(0.5)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	538	2,886	6,774	8,330	6,936	4,217	2,216	927	361	167	33,352	16,229	49,581	108.18	32.81
(%)	(1.6)	(8.7)	(20.3)	(25.0)	(20.8)	(12.6)	(6.6)	(2.8)	(1.1)	(0.5)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査