

表 3226 Non-HDL-C濃度(mg/dL) 年齢(歳)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

| 年齢           | 50未満         | 50～            | 70～             | 90～             | 110～            | 130～            | 150～           | 170～         | 190～         | 210～         | 合計                | 記載なし   | 総計     | 平均     | 標準偏差  |
|--------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------|--------|--------|-------|
| 15歳未満<br>(%) |              |                | 1<br>(100.0)    |                 |                 |                 |                |              |              |              | 1<br>(100.0)      |        | 1      | 86.00  |       |
| 15歳～<br>(%)  | 3<br>(2.1)   | 18<br>(12.9)   | 29<br>(20.7)    | 33<br>(23.6)    | 29<br>(20.7)    | 19<br>(13.6)    | 8<br>(5.7)     | 1<br>(0.7)   |              |              | 140<br>(100.0)    | 60     | 200    | 102.07 | 30.40 |
| 30歳～<br>(%)  | 21<br>(1.1)  | 148<br>(7.4)   | 355<br>(17.8)   | 516<br>(25.9)   | 439<br>(22.0)   | 248<br>(12.4)   | 141<br>(7.1)   | 77<br>(3.9)  | 29<br>(1.5)  | 21<br>(1.1)  | 1,995<br>(100.0)  | 922    | 2,917  | 112.01 | 34.08 |
| 45歳～<br>(%)  | 114<br>(1.5) | 570<br>(7.4)   | 1,377<br>(17.9) | 1,796<br>(23.4) | 1,691<br>(22.0) | 1,111<br>(14.5) | 601<br>(7.8)   | 259<br>(3.4) | 105<br>(1.4) | 59<br>(0.8)  | 7,683<br>(100.0)  | 3,523  | 11,206 | 112.03 | 33.92 |
| 60歳～<br>(%)  | 245<br>(1.6) | 1,382<br>(8.9) | 3,182<br>(20.4) | 3,904<br>(25.1) | 3,165<br>(20.3) | 1,981<br>(12.7) | 1,045<br>(6.7) | 432<br>(2.8) | 171<br>(1.1) | 64<br>(0.4)  | 15,571<br>(100.0) | 7,586  | 23,157 | 107.96 | 32.73 |
| 75歳～<br>(%)  | 148<br>(1.9) | 732<br>(9.6)   | 1,745<br>(22.9) | 1,996<br>(26.2) | 1,531<br>(20.1) | 819<br>(10.8)   | 409<br>(5.4)   | 148<br>(1.9) | 54<br>(0.7)  | 22<br>(0.3)  | 7,604<br>(100.0)  | 3,923  | 11,527 | 104.07 | 31.05 |
| 90歳～<br>(%)  | 7<br>(2.0)   | 36<br>(10.1)   | 85<br>(23.7)    | 85<br>(23.7)    | 81<br>(22.6)    | 39<br>(10.9)    | 12<br>(3.4)    | 10<br>(2.8)  | 2<br>(0.6)   | 1<br>(0.3)   | 358<br>(100.0)    | 215    | 573    | 103.36 | 30.53 |
| 合計<br>(%)    | 538<br>(1.6) | 2,886<br>(8.7) | 6,774<br>(20.3) | 8,330<br>(25.0) | 6,936<br>(20.8) | 4,217<br>(12.6) | 2,216<br>(6.6) | 927<br>(2.8) | 361<br>(1.1) | 167<br>(0.5) | 33,352<br>(100.0) | 16,229 | 49,581 | 108.18 | 32.81 |
| 不明<br>(%)    |              |                |                 |                 |                 |                 |                |              |              |              |                   |        |        |        |       |
| 記載なし<br>(%)  |              |                |                 |                 |                 |                 |                |              |              |              |                   |        |        |        |       |
| 総計<br>(%)    | 538<br>(1.6) | 2,886<br>(8.7) | 6,774<br>(20.3) | 8,330<br>(25.0) | 6,936<br>(20.8) | 4,217<br>(12.6) | 2,216<br>(6.6) | 927<br>(2.8) | 361<br>(1.1) | 167<br>(0.5) | 33,352<br>(100.0) | 16,229 | 49,581 | 108.18 | 32.81 |
| 平均           | 66.75        | 66.46          | 66.37           | 65.60           | 64.84           | 64.40           | 63.52          | 63.02        | 62.43        | 60.68        | 65.27             | 65.84  | 65.46  |        |       |
| 標準偏差         | 12.40        | 12.52          | 12.43           | 12.54           | 12.47           | 12.26           | 12.16          | 12.45        | 12.33        | 12.63        | 12.48             | 12.50  | 12.49  |        |       |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。  
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2015年調査