

表 3234 Non-HDL-C濃度(mg/dL) 性別（腹膜透析患者）

性別	50未満	50～	70～	90～	110～	130～	150～	170～	190～	210～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	15 (0.7)	99 (4.3)	277 (12.0)	504 (21.9)	541 (23.5)	369 (16.0)	277 (12.0)	123 (5.3)	57 (2.5)	38 (1.7)	2,300 (100.0)	3,374	5,674	122.47	35.99
女性 (%)	3 (0.2)	29 (2.3)	90 (7.0)	186 (14.6)	286 (22.4)	249 (19.5)	186 (14.6)	135 (10.6)	62 (4.9)	52 (4.1)	1,278 (100.0)	1,817	3,095	137.36	39.00
合計 (%)	18 (0.5)	128 (3.6)	367 (10.3)	690 (19.3)	827 (23.1)	618 (17.3)	463 (12.9)	258 (7.2)	119 (3.3)	90 (2.5)	3,578 (100.0)	5,191	8,769	127.79	37.77
記載なし (%)															
総計 (%)	18 (0.5)	128 (3.6)	367 (10.3)	690 (19.3)	827 (23.1)	618 (17.3)	463 (12.9)	258 (7.2)	119 (3.3)	90 (2.5)	3,578 (100.0)	5,191	8,769	127.79	37.77

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査