

表 3235 Non-HDL-C濃度(mg/dL) 年齢(歳)別 (腹膜透析患者)

年齢	50未満	50～	70～	90～	110～	130～	150～	170～	190～	210～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)				1 (12.5)	1 (12.5)	1 (12.5)	1 (12.5)	1 (12.5)	1 (12.5)	2 (25.0)	8 (100.0)	81	89	173.88	51.52
15歳～ (%)		1 (3.2)	4 (12.9)	9 (29.0)	7 (22.6)	6 (19.4)		1 (3.2)	1 (3.2)	2 (6.5)	31 (100.0)	70	101	121.48	37.89
30歳～ (%)		7 (2.7)	34 (13.0)	47 (17.9)	77 (29.4)	48 (18.3)	24 (9.2)	13 (5.0)	7 (2.7)	5 (1.9)	262 (100.0)	398	660	124.49	34.31
45歳～ (%)	5 (0.5)	36 (3.6)	93 (9.4)	177 (17.9)	218 (22.1)	171 (17.3)	142 (14.4)	89 (9.0)	34 (3.4)	22 (2.2)	987 (100.0)	1,333	2,320	130.00	38.56
60歳～ (%)	8 (0.5)	60 (3.8)	167 (10.5)	316 (19.8)	366 (23.0)	272 (17.1)	204 (12.8)	107 (6.7)	49 (3.1)	43 (2.7)	1,592 (100.0)	2,231	3,823	126.93	37.86
75歳～ (%)	5 (0.8)	24 (3.7)	65 (10.0)	129 (19.8)	149 (22.9)	108 (16.6)	89 (13.7)	44 (6.8)	24 (3.7)	14 (2.2)	651 (100.0)	998	1,649	127.15	36.92
90歳～ (%)			4 (8.5)	11 (23.4)	9 (19.1)	12 (25.5)	3 (6.4)	3 (6.4)	3 (6.4)	2 (4.3)	47 (100.0)	80	127	133.64	39.55
合計 (%)	18 (0.5)	128 (3.6)	367 (10.3)	690 (19.3)	827 (23.1)	618 (17.3)	463 (12.9)	258 (7.2)	119 (3.3)	90 (2.5)	3,578 (100.0)	5,191	8,769	127.79	37.77
不明 (%)															
記載なし (%)															
総計 (%)	18 (0.5)	128 (3.6)	367 (10.3)	690 (19.3)	827 (23.1)	618 (17.3)	463 (12.9)	258 (7.2)	119 (3.3)	90 (2.5)	3,578 (100.0)	5,191	8,769	127.79	37.77
平均	65.06	63.25	62.85	63.50	62.87	63.09	63.58	62.85	63.20	62.06	63.13	62.57	62.80		
標準偏差	10.75	11.63	13.31	13.55	13.49	13.64	12.16	12.96	14.43	16.19	13.33	15.38	14.58		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査