

表 3236 Non-HDL-C濃度(mg/dL) 透析歴(年)別 (腹膜透析患者)

透析歴	50未満	50～	70～	90～	110～	130～	150～	170～	190～	210～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満	5	40	143	271	312	233	200	113	44	42	1,403	2,277	3,680	129.62	38.02
(%)	(0.4)	(2.9)	(10.2)	(19.3)	(22.2)	(16.6)	(14.3)	(8.1)	(3.1)	(3.0)	(100.0)				
2年～	3	48	124	249	305	226	152	82	46	31	1,266	1,836	3,102	127.56	37.50
(%)	(0.2)	(3.8)	(9.8)	(19.7)	(24.1)	(17.9)	(12.0)	(6.5)	(3.6)	(2.4)	(100.0)				
5年～	8	28	72	124	159	120	80	48	18	9	666	854	1,520	124.62	36.79
(%)	(1.2)	(4.2)	(10.8)	(18.6)	(23.9)	(18.0)	(12.0)	(7.2)	(2.7)	(1.4)	(100.0)				
10年～	1	6	18	34	43	28	23	10	7	4	174	140	314	126.62	35.99
(%)	(0.6)	(3.4)	(10.3)	(19.5)	(24.7)	(16.1)	(13.2)	(5.7)	(4.0)	(2.3)	(100.0)				
15年～		6	5	6	7	7	5	4	3		43	44	87	123.05	42.08
(%)		(14.0)	(11.6)	(14.0)	(16.3)	(16.3)	(11.6)	(9.3)	(7.0)		(100.0)				
20年～	1		1	4		2				2	10	16	26	131.10	67.40
(%)	(10.0)		(10.0)	(40.0)		(20.0)				(20.0)	(100.0)				
25年～			3		1	1	1	1			7	5	12	118.43	42.63
(%)			(42.9)		(14.3)	(14.3)	(14.3)	(14.3)			(100.0)				
30年～				1			2				3	3	6	148.33	34.08
(%)				(33.3)			(66.7)				(100.0)				
35年～			1								1	1	2	70.00	
(%)			(100.0)								(100.0)				
40年～									1		1	1	2	192.00	
(%)									(100.0)		(100.0)				
合計	18	128	367	689	827	617	463	258	119	88	3,574	5,177	8,751	127.73	37.70
(%)	(0.5)	(3.6)	(10.3)	(19.3)	(23.1)	(17.3)	(13.0)	(7.2)	(3.3)	(2.5)	(100.0)				
不明				1		1				2	4	14	18	176.50	67.27
(%)				(25.0)		(25.0)				(50.0)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	18	128	367	690	827	618	463	258	119	90	3,578	5,191	8,769	127.79	37.77
(%)	(0.5)	(3.6)	(10.3)	(19.3)	(23.1)	(17.3)	(12.9)	(7.2)	(3.3)	(2.5)	(100.0)				
平均	4.94	3.91	3.53	3.24	3.22	3.27	3.17	3.18	3.60	2.95	3.29	2.79	2.99		
標準偏差	4.89	4.10	4.42	3.65	3.36	3.56	3.95	3.88	5.01	4.17	3.81	3.35	3.55		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査