

表 3238 Non-HDL-C濃度(mg/dL) 医療機関別（腹膜透析患者）

医療機関	50未満	50～	70～	90～	110～	130～	150～	170～	190～	210～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学		5	17	45	59	36	25	16	12	7	222	441	663	131.41	37.33
(%)		(2.3)	(7.7)	(20.3)	(26.6)	(16.2)	(11.3)	(7.2)	(5.4)	(3.2)	(100.0)				
私立大学		12	25	56	64	61	52	24	11	7	312	794	1,106	131.96	37.93
(%)		(3.8)	(8.0)	(17.9)	(20.5)	(19.6)	(16.7)	(7.7)	(3.5)	(2.2)	(100.0)				
国立		2	3	10	14	12	6	2	1	1	51	171	222	127.94	31.82
(%)		(3.9)	(5.9)	(19.6)	(27.5)	(23.5)	(11.8)	(3.9)	(2.0)	(2.0)	(100.0)				
県市町村立	2	32	80	150	144	106	86	39	16	18	673	900	1,573	123.96	37.26
(%)	(0.3)	(4.8)	(11.9)	(22.3)	(21.4)	(15.8)	(12.8)	(5.8)	(2.4)	(2.7)	(100.0)				
社会保険		4	18	16	29	24	18	13	4	5	131	391	522	132.18	40.04
(%)		(3.1)	(13.7)	(12.2)	(22.1)	(18.3)	(13.7)	(9.9)	(3.1)	(3.8)	(100.0)				
厚生連	4	5	36	62	76	48	28	15	12	10	296	264	560	126.03	39.58
(%)	(1.4)	(1.7)	(12.2)	(20.9)	(25.7)	(16.2)	(9.5)	(5.1)	(4.1)	(3.4)	(100.0)				
その他公的	4	18	52	113	120	106	72	52	10	14	561	798	1,359	128.59	37.97
(%)	(0.7)	(3.2)	(9.3)	(20.1)	(21.4)	(18.9)	(12.8)	(9.3)	(1.8)	(2.5)	(100.0)				
私立総合	2	6	11	28	38	34	18	8	5	4	154	209	363	126.92	37.16
(%)	(1.3)	(3.9)	(7.1)	(18.2)	(24.7)	(22.1)	(11.7)	(5.2)	(3.2)	(2.6)	(100.0)				
私立	4	32	75	125	190	120	110	69	32	17	774	925	1,699	129.55	38.36
(%)	(0.5)	(4.1)	(9.7)	(16.1)	(24.5)	(15.5)	(14.2)	(8.9)	(4.1)	(2.2)	(100.0)				
私立診療所	2	12	50	85	93	71	48	20	16	7	404	298	702	124.63	35.51
(%)	(0.5)	(3.0)	(12.4)	(21.0)	(23.0)	(17.6)	(11.9)	(5.0)	(4.0)	(1.7)	(100.0)				
総計	18	128	367	690	827	618	463	258	119	90	3,578	5,191	8,769	127.79	37.77
(%)	(0.5)	(3.6)	(10.3)	(19.3)	(23.1)	(17.3)	(12.9)	(7.2)	(3.3)	(2.5)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査