

表 3247 透析前収縮期血圧(mmHg) 年齢(歳)別 (透析患者全体)

年齢	60未満	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)		2 (2.8)	18 (25.0)	26 (36.1)	18 (25.0)	7 (9.7)	1 (1.4)				72 (100.0)	31	103	113.11	21.27
15歳～ (%)	1 (0.1)		11 (1.3)	94 (11.4)	212 (25.7)	290 (35.2)	156 (18.9)	48 (5.8)	11 (1.3)	2 (0.2)	825 (100.0)	145	970	145.48	23.19
30歳～ (%)	2 (0.0)	15 (0.1)	158 (1.3)	815 (6.8)	2,665 (22.1)	3,754 (31.1)	2,904 (24.1)	1,289 (10.7)	370 (3.1)	85 (0.7)	12,057 (100.0)	1,799	13,856	152.68	25.18
45歳～ (%)	7 (0.0)	82 (0.2)	575 (1.2)	3,061 (6.2)	9,599 (19.5)	15,735 (32.0)	12,731 (25.9)	5,403 (11.0)	1,576 (3.2)	331 (0.7)	49,100 (100.0)	7,241	56,341	154.05	24.79
60歳～ (%)	15 (0.0)	186 (0.2)	1,549 (1.2)	8,123 (6.6)	25,760 (20.8)	41,417 (33.4)	31,237 (25.2)	12,022 (9.7)	2,981 (2.4)	654 (0.5)	123,944 (100.0)	17,690	141,634	152.35	24.12
75歳～ (%)	19 (0.0)	152 (0.2)	1,401 (1.7)	7,207 (8.7)	19,659 (23.8)	26,982 (32.7)	18,506 (22.4)	6,782 (8.2)	1,575 (1.9)	305 (0.4)	82,588 (100.0)	12,160	94,748	149.02	24.31
90歳～ (%)	2 (0.0)	8 (0.2)	166 (3.5)	571 (11.9)	1,229 (25.6)	1,445 (30.1)	924 (19.3)	358 (7.5)	83 (1.7)	12 (0.3)	4,798 (100.0)	762	5,560	145.19	25.65
合計 (%)	46 (0.0)	445 (0.2)	3,878 (1.4)	19,897 (7.3)	59,142 (21.6)	89,630 (32.8)	66,459 (24.3)	25,902 (9.5)	6,596 (2.4)	1,389 (0.5)	273,384 (100.0)	39,828	313,212	151.51	24.47
不明 (%)						1 (50.0)	1 (50.0)				2 (100.0)	2	4	157.00	8.49
記載なし (%)												1	1		
総計 (%)	46 (0.0)	445 (0.2)	3,878 (1.4)	19,897 (7.3)	59,142 (21.6)	89,631 (32.8)	66,460 (24.3)	25,902 (9.5)	6,596 (2.4)	1,389 (0.5)	273,386 (100.0)	39,831	313,217	151.51	24.47
平均	69.28	68.63	69.91	69.49	68.61	67.93	67.28	66.55	65.53	64.82	67.86	67.88	67.86		
標準偏差	14.77	12.99	13.77	13.17	12.68	12.28	12.15	12.27	12.41	12.36	12.46	12.72	12.49		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査