

表 3249 透析前収縮期血圧(mmHg) 原疾患別（透析患者全体）

原疾患	60未満	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 （％）	18 (0.0)	173 (0.2)	1,387 (1.7)	6,768 (8.3)	19,977 (24.5)	28,044 (34.4)	17,979 (22.1)	5,771 (7.1)	1,179 (1.4)	198 (0.2)	81,494 (100.0)	11,853	93,347	148.08	23.34
慢性腎盂腎炎 （％）	1 (0.0)	10 (0.4)	75 (2.9)	271 (10.3)	673 (25.7)	860 (32.8)	524 (20.0)	164 (6.3)	35 (1.3)	8 (0.3)	2,621 (100.0)	314	2,935	145.49	24.54
急速進行性糸球 体腎炎 （％）		3 (0.1)	34 (1.6)	184 (8.5)	580 (26.9)	733 (34.0)	455 (21.1)	139 (6.5)	24 (1.1)	2 (0.1)	2,154 (100.0)	324	2,478	147.07	22.50
妊娠腎/妊娠中毒 症 （％）		6 (0.4)	32 (2.3)	131 (9.4)	331 (23.8)	474 (34.1)	282 (20.3)	112 (8.1)	18 (1.3)	4 (0.3)	1,390 (100.0)	155	1,545	147.51	24.37
その他の分類不 能の腎炎 （％）		1 (0.1)	28 (2.3)	121 (9.9)	296 (24.1)	400 (32.6)	273 (22.2)	86 (7.0)	18 (1.5)	4 (0.3)	1,227 (100.0)	178	1,405	147.23	23.93
多発性嚢胞腎 （％）	1 (0.0)	11 (0.1)	144 (1.5)	914 (9.2)	2,697 (27.2)	3,570 (36.0)	1,979 (20.0)	506 (5.1)	82 (0.8)	15 (0.2)	9,919 (100.0)	1,337	11,256	145.77	21.91
腎硬化症 （％）	2 (0.0)	39 (0.1)	407 (1.6)	2,198 (8.4)	6,239 (23.9)	8,782 (33.6)	6,009 (23.0)	1,927 (7.4)	438 (1.7)	74 (0.3)	26,115 (100.0)	3,690	29,805	148.78	23.51
悪性高血圧 （％）		2 (0.1)	15 (0.7)	147 (6.5)	503 (22.2)	750 (33.0)	580 (25.6)	214 (9.4)	48 (2.1)	11 (0.5)	2,270 (100.0)	348	2,618	152.10	23.07
糖尿病性腎症 （％）	10 (0.0)	84 (0.1)	843 (0.8)	5,317 (5.1)	17,965 (17.1)	32,541 (31.0)	29,414 (28.0)	13,875 (13.2)	4,083 (3.9)	935 (0.9)	105,067 (100.0)	15,211	120,278	157.18	24.76
SLE腎炎 （％）	2 (0.1)	11 (0.6)	36 (1.9)	171 (8.8)	477 (24.7)	657 (34.0)	406 (21.0)	146 (7.5)	24 (1.2)	4 (0.2)	1,934 (100.0)	293	2,227	147.13	24.06
アミロイド腎 （％）	1 (0.3)	2 (0.5)	12 (3.1)	45 (11.6)	89 (22.9)	126 (32.4)	72 (18.5)	38 (9.8)	3 (0.8)	1 (0.3)	389 (100.0)	73	462	145.41	25.69
痛風腎 （％）	1 (0.1)	3 (0.3)	24 (2.5)	75 (7.9)	233 (24.5)	322 (33.8)	222 (23.3)	65 (6.8)	6 (0.6)	1 (0.1)	952 (100.0)	123	1,075	147.28	23.39
先天性代謝異常 による腎不全 （％）	2 (0.9)	4 (1.7)	8 (3.5)	28 (12.1)	78 (33.8)	58 (25.1)	33 (14.3)	16 (6.9)	3 (1.3)	1 (0.4)	231 (100.0)	43	274	141.12	27.36
腎・尿路結核 （％）			4 (2.4)	19 (11.2)	39 (22.9)	58 (34.1)	41 (24.1)	7 (4.1)		2 (1.2)	170 (100.0)	25	195	146.11	23.51
腎・尿路結石 （％）			14 (2.7)	54 (10.5)	132 (25.6)	158 (30.6)	120 (23.3)	32 (6.2)	5 (1.0)	1 (0.2)	516 (100.0)	65	581	146.12	23.84
腎・尿路腫瘍 （％）		1 (0.1)	16 (2.0)	79 (9.9)	176 (22.0)	292 (36.5)	169 (21.1)	57 (7.1)	10 (1.3)		800 (100.0)	110	910	147.41	23.07
閉塞性尿路障害 （％）		1 (0.2)	10 (1.6)	80 (12.6)	150 (23.5)	209 (32.8)	137 (21.5)	39 (6.1)	5 (0.8)	6 (0.9)	637 (100.0)	93	730	146.10	24.19
骨髄腫 （％）			10 (4.0)	47 (18.9)	74 (29.7)	61 (24.5)	45 (18.1)	9 (3.6)	3 (1.2)		249 (100.0)	42	291	139.26	24.97
腎形成不全 （％）		2 (0.3)	21 (3.6)	70 (12.1)	148 (25.5)	201 (34.7)	104 (17.9)	28 (4.8)	3 (0.5)	3 (0.5)	580 (100.0)	80	660	143.05	24.13
不明 （％）	5 (0.0)	63 (0.2)	523 (2.0)	2,272 (8.8)	6,089 (23.6)	8,465 (32.8)	5,818 (22.5)	2,034 (7.9)	464 (1.8)	96 (0.4)	25,829 (100.0)	4,068	29,897	148.66	24.44
再導入 （％）	1 (0.1)	5 (0.3)	48 (2.6)	178 (9.5)	468 (24.9)	654 (34.8)	363 (19.3)	132 (7.0)	28 (1.5)	4 (0.2)	1,881 (100.0)	302	2,183	146.42	23.94
その他 （％）	2 (0.0)	24 (0.3)	187 (2.7)	726 (10.5)	1,727 (24.9)	2,210 (31.8)	1,432 (20.6)	503 (7.2)	116 (1.7)	19 (0.3)	6,946 (100.0)	1,098	8,044	146.34	24.80
合計 （％）	46 (0.0)	445 (0.2)	3,878 (1.4)	19,895 (7.3)	59,141 (21.6)	89,625 (32.8)	66,457 (24.3)	25,900 (9.5)	6,595 (2.4)	1,389 (0.5)	273,371 (100.0)	39,825	313,196	151.51	24.47
記載なし （％）				2 (13.3)	1 (6.7)	6 (40.0)	3 (20.0)	2 (13.3)	1 (6.7)		15 (100.0)	6	21	156.07	27.88
総計 （％）	46 (0.0)	445 (0.2)	3,878 (1.4)	19,897 (7.3)	59,142 (21.6)	89,631 (32.8)	66,460 (24.3)	25,902 (9.5)	6,596 (2.4)	1,389 (0.5)	273,386 (100.0)	39,831	313,217	151.51	24.47

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査