

表 3254 透析前収縮期血圧(mmHg) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

性別	60未満	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	16	170	1,484	8,765	28,558	45,298	34,459	13,137	3,271	643	135,801	8,639	144,440	152.42	23.82
(%)	(0.0)	(0.1)	(1.1)	(6.5)	(21.0)	(33.4)	(25.4)	(9.7)	(2.4)	(0.5)	(100.0)				
女性	16	143	1,174	5,968	16,462	24,099	17,536	7,090	1,872	408	74,768	4,644	79,412	150.95	25.01
(%)	(0.0)	(0.2)	(1.6)	(8.0)	(22.0)	(32.2)	(23.5)	(9.5)	(2.5)	(0.5)	(100.0)				
合計	32	313	2,658	14,733	45,020	69,397	51,995	20,227	5,143	1,051	210,569	13,283	223,852	151.90	24.26
(%)	(0.0)	(0.1)	(1.3)	(7.0)	(21.4)	(33.0)	(24.7)	(9.6)	(2.4)	(0.5)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	32	313	2,658	14,733	45,020	69,397	51,995	20,227	5,143	1,051	210,569	13,283	223,852	151.90	24.26
(%)	(0.0)	(0.1)	(1.3)	(7.0)	(21.4)	(33.0)	(24.7)	(9.6)	(2.4)	(0.5)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査