

表 3255 透析前収縮期血圧(mmHg) 年齢(歳)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

年齢	60未満	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)				3 (30.0)	3 (30.0)	3 (30.0)	1 (10.0)				10 (100.0)		10	136.20	23.26
15歳～ (%)	1 (0.2)		6 (1.1)	57 (10.6)	129 (23.9)	193 (35.7)	112 (20.7)	35 (6.5)	7 (1.3)		540 (100.0)	37	577	146.47	22.61
30歳～ (%)	1 (0.0)	11 (0.1)	93 (1.1)	545 (6.4)	1,822 (21.5)	2,621 (31.0)	2,107 (24.9)	946 (11.2)	266 (3.1)	55 (0.6)	8,467 (100.0)	537	9,004	153.43	24.99
45歳～ (%)	3 (0.0)	53 (0.2)	369 (1.0)	2,042 (5.8)	6,741 (19.1)	11,299 (32.0)	9,390 (26.6)	4,002 (11.3)	1,180 (3.3)	231 (0.7)	35,310 (100.0)	2,260	37,570	154.72	24.56
60歳～ (%)	12 (0.0)	133 (0.1)	1,016 (1.1)	5,902 (6.2)	19,376 (20.4)	31,935 (33.6)	24,409 (25.7)	9,408 (9.9)	2,345 (2.5)	523 (0.6)	95,059 (100.0)	5,883	100,942	152.90	23.94
75歳～ (%)	13 (0.0)	110 (0.2)	1,047 (1.6)	5,725 (8.5)	15,947 (23.7)	22,167 (33.0)	15,198 (22.6)	5,548 (8.2)	1,275 (1.9)	232 (0.3)	67,262 (100.0)	4,303	71,565	149.22	24.07
90歳～ (%)	2 (0.1)	6 (0.2)	127 (3.2)	459 (11.7)	1,002 (25.6)	1,178 (30.1)	777 (19.8)	288 (7.3)	70 (1.8)	10 (0.3)	3,919 (100.0)	261	4,180	145.49	25.57
合計 (%)	32 (0.0)	313 (0.1)	2,658 (1.3)	14,733 (7.0)	45,020 (21.4)	69,396 (33.0)	51,994 (24.7)	20,227 (9.6)	5,143 (2.4)	1,051 (0.5)	210,567 (100.0)	13,281	223,848	151.90	24.26
不明 (%)						1 (50.0)	1 (50.0)				2 (100.0)	1	3	157.00	8.49
記載なし (%)												1	1		
総計 (%)	32 (0.0)	313 (0.1)	2,658 (1.3)	14,733 (7.0)	45,020 (21.4)	69,397 (33.0)	51,995 (24.7)	20,227 (9.6)	5,143 (2.4)	1,051 (0.5)	210,569 (100.0)	13,283	223,852	151.90	24.26
平均	69.72	69.42	71.16	70.41	69.34	68.57	67.80	67.01	66.00	65.29	68.48	68.62	68.49		
標準偏差	15.41	12.46	12.89	12.77	12.45	12.12	12.06	12.18	12.30	11.99	12.28	12.37	12.29		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査