

表 3257 透析前収縮期血圧(mmHg) 原疾患別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

原疾患	60未満	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 （％）	10 (0.0)	119 (0.2)	879 (1.5)	4,726 (7.9)	14,448 (24.2)	20,850 (34.9)	13,356 (22.3)	4,380 (7.3)	887 (1.5)	140 (0.2)	59,795 (100.0)	3,679	63,474	148.62	23.11
慢性腎盂腎炎 （％）		5 (0.3)	53 (2.7)	184 (9.5)	502 (25.8)	641 (33.0)	404 (20.8)	119 (6.1)	29 (1.5)	5 (0.3)	1,942 (100.0)	98	2,040	146.06	24.09
急速進行性糸球 体腎炎 （％）		3 (0.2)	19 (1.1)	137 (8.2)	444 (26.5)	579 (34.5)	371 (22.1)	104 (6.2)	20 (1.2)	1 (0.1)	1,678 (100.0)	93	1,771	147.69	22.15
妊娠腎/妊娠中毒 症 （％）		2 (0.2)	17 (1.8)	82 (8.9)	234 (25.3)	315 (34.1)	190 (20.5)	71 (7.7)	12 (1.3)	2 (0.2)	925 (100.0)	56	981	147.70	23.69
その他の分類不 能の腎炎 （％）			21 (2.4)	79 (9.0)	208 (23.8)	280 (32.1)	201 (23.0)	69 (7.9)	12 (1.4)	3 (0.3)	873 (100.0)	56	929	148.04	23.87
多発性嚢胞腎 （％）	1 (0.0)	5 (0.1)	102 (1.4)	683 (9.1)	2,025 (26.9)	2,746 (36.4)	1,521 (20.2)	389 (5.2)	58 (0.8)	10 (0.1)	7,540 (100.0)	476	8,016	146.08	21.69
腎硬化症 （％）	1 (0.0)	24 (0.1)	296 (1.4)	1,690 (8.1)	4,975 (23.9)	7,029 (33.7)	4,883 (23.4)	1,519 (7.3)	355 (1.7)	57 (0.3)	20,829 (100.0)	1,178	22,007	149.05	23.28
悪性高血圧 （％）		2 (0.1)	13 (0.7)	117 (6.7)	378 (21.6)	585 (33.4)	455 (26.0)	157 (9.0)	39 (2.2)	7 (0.4)	1,753 (100.0)	108	1,861	151.96	23.05
糖尿病性腎症 （％）	9 (0.0)	70 (0.1)	627 (0.7)	4,233 (5.0)	14,328 (17.0)	26,028 (31.0)	23,753 (28.3)	11,060 (13.2)	3,213 (3.8)	724 (0.9)	84,045 (100.0)	5,381	89,426	157.18	24.62
SLE腎炎 （％）		6 (0.4)	24 (1.7)	122 (8.7)	348 (24.7)	488 (34.7)	290 (20.6)	108 (7.7)	19 (1.4)	2 (0.1)	1,407 (100.0)	97	1,504	147.44	23.56
アミロイド腎 （％）	1 (0.3)	1 (0.3)	6 (2.1)	28 (9.7)	68 (23.4)	93 (32.1)	57 (19.7)	34 (11.7)	1 (0.3)	1 (0.3)	290 (100.0)	24	314	147.50	25.40
痛風腎 （％）	1 (0.1)	2 (0.3)	20 (2.7)	55 (7.4)	178 (24.0)	258 (34.8)	173 (23.3)	49 (6.6)	5 (0.7)	1 (0.1)	742 (100.0)	36	778	147.56	23.26
先天性代謝異常 による腎不全 （％）	2 (1.2)	3 (1.8)	5 (3.0)	22 (13.4)	53 (32.3)	41 (25.0)	23 (14.0)	12 (7.3)	2 (1.2)	1 (0.6)	164 (100.0)	9	173	140.74	28.08
腎・尿路結核 （％）			3 (2.3)	15 (11.3)	30 (22.6)	47 (35.3)	31 (23.3)	6 (4.5)		1 (0.8)	133 (100.0)	8	141	145.76	23.03
腎・尿路結石 （％）			13 (3.2)	37 (9.2)	100 (24.8)	129 (32.0)	93 (23.1)	25 (6.2)	5 (1.2)	1 (0.2)	403 (100.0)	18	421	146.97	24.20
腎・尿路腫瘍 （％）		1 (0.2)	9 (1.4)	61 (9.4)	141 (21.8)	241 (37.2)	134 (20.7)	50 (7.7)	10 (1.5)		647 (100.0)	31	678	147.99	23.00
閉塞性尿路障害 （％）			6 (1.3)	55 (11.7)	113 (24.0)	159 (33.8)	104 (22.1)	25 (5.3)	5 (1.1)	4 (0.8)	471 (100.0)	23	494	146.67	23.34
骨髄腫 （％）			3 (1.7)	36 (20.0)	52 (28.9)	45 (25.0)	36 (20.0)	5 (2.8)	3 (1.7)		180 (100.0)	10	190	140.60	24.56
腎形成不全 （％）		2 (0.5)	9 (2.3)	32 (8.4)	98 (25.6)	140 (36.6)	80 (20.9)	18 (4.7)	2 (0.5)	2 (0.5)	383 (100.0)	17	400	145.62	22.70
不明 （％）	4 (0.0)	47 (0.2)	384 (1.9)	1,688 (8.6)	4,631 (23.5)	6,546 (33.2)	4,476 (22.7)	1,540 (7.8)	351 (1.8)	71 (0.4)	19,738 (100.0)	1,438	21,176	148.78	24.25
再導入 （％）	1 (0.1)	4 (0.3)	30 (2.3)	111 (8.6)	334 (25.8)	451 (34.8)	248 (19.1)	93 (7.2)	21 (1.6)	4 (0.3)	1,297 (100.0)	59	1,356	146.79	23.95
その他 （％）	2 (0.0)	17 (0.3)	119 (2.2)	538 (10.1)	1,331 (25.0)	1,703 (32.0)	1,116 (20.9)	394 (7.4)	94 (1.8)	14 (0.3)	5,328 (100.0)	387	5,715	146.93	24.61
合計 （％）	32 (0.0)	313 (0.1)	2,658 (1.3)	14,731 (7.0)	45,019 (21.4)	69,394 (33.0)	51,995 (24.7)	20,227 (9.6)	5,143 (2.4)	1,051 (0.5)	210,563 (100.0)	13,282	223,845	151.90	24.26
記載なし （％）				2 (33.3)	1 (16.7)	3 (50.0)					6 (100.0)	1	7	131.33	20.10
総計 （％）	32 (0.0)	313 (0.1)	2,658 (1.3)	14,733 (7.0)	45,020 (21.4)	69,397 (33.0)	51,995 (24.7)	20,227 (9.6)	5,143 (2.4)	1,051 (0.5)	210,569 (100.0)	13,283	223,852	151.90	24.26

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査