

表 3262 透析前収縮期血圧(mmHg) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

性別	60未満	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	5	45	456	2,021	6,170	9,803	7,448	3,054	802	165	29,969	1,661	31,630	152.56	24.66
(%)	(0.0)	(0.2)	(1.5)	(6.7)	(20.6)	(32.7)	(24.9)	(10.2)	(2.7)	(0.6)	(100.0)				
女性	6	46	383	1,492	3,704	5,291	3,921	1,590	430	106	16,969	982	17,951	150.22	26.00
(%)	(0.0)	(0.3)	(2.3)	(8.8)	(21.8)	(31.2)	(23.1)	(9.4)	(2.5)	(0.6)	(100.0)				
合計	11	91	839	3,513	9,874	15,094	11,369	4,644	1,232	271	46,938	2,643	49,581	151.71	25.18
(%)	(0.0)	(0.2)	(1.8)	(7.5)	(21.0)	(32.2)	(24.2)	(9.9)	(2.6)	(0.6)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	11	91	839	3,513	9,874	15,094	11,369	4,644	1,232	271	46,938	2,643	49,581	151.71	25.18
(%)	(0.0)	(0.2)	(1.8)	(7.5)	(21.0)	(32.2)	(24.2)	(9.9)	(2.6)	(0.6)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査