

表 3263 透析前収縮期血圧(mmHg) 年齢(歳)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

年齢	60未満	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)					1 (100.0)						1 (100.0)		1	124.00	
15歳～ (%)			2 (1.1)	13 (6.8)	54 (28.4)	74 (38.9)	32 (16.8)	9 (4.7)	4 (2.1)	2 (1.1)	190 (100.0)	10	200	147.81	22.74
30歳～ (%)	1 (0.0)	4 (0.1)	36 (1.3)	192 (7.0)	583 (21.1)	885 (32.1)	645 (23.4)	291 (10.6)	93 (3.4)	28 (1.0)	2,758 (100.0)	159	2,917	152.81	25.73
45歳～ (%)	3 (0.0)	23 (0.2)	149 (1.4)	737 (6.9)	2,063 (19.4)	3,355 (31.5)	2,705 (25.4)	1,182 (11.1)	350 (3.3)	76 (0.7)	10,643 (100.0)	563	11,206	153.74	25.47
60歳～ (%)	3 (0.0)	36 (0.2)	379 (1.7)	1,546 (7.0)	4,551 (20.7)	7,187 (32.8)	5,439 (24.8)	2,153 (9.8)	546 (2.5)	103 (0.5)	21,943 (100.0)	1,214	23,157	151.92	24.67
75歳～ (%)	4 (0.0)	28 (0.3)	251 (2.3)	961 (8.8)	2,495 (22.9)	3,440 (31.6)	2,449 (22.5)	959 (8.8)	230 (2.1)	61 (0.6)	10,878 (100.0)	649	11,527	149.39	25.51
90歳～ (%)			22 (4.2)	64 (12.2)	127 (24.2)	153 (29.1)	99 (18.9)	50 (9.5)	9 (1.7)	1 (0.2)	525 (100.0)	48	573	145.73	26.60
合計 (%)	11 (0.0)	91 (0.2)	839 (1.8)	3,513 (7.5)	9,874 (21.0)	15,094 (32.2)	11,369 (24.2)	4,644 (9.9)	1,232 (2.6)	271 (0.6)	46,938 (100.0)	2,643	49,581	151.71	25.18
不明 (%)															
記載なし (%)															
総計 (%)	11 (0.0)	91 (0.2)	839 (1.8)	3,513 (7.5)	9,874 (21.0)	15,094 (32.2)	11,369 (24.2)	4,644 (9.9)	1,232 (2.6)	271 (0.6)	46,938 (100.0)	2,643	49,581	151.71	25.18
平均	67.18	66.35	68.35	66.80	66.01	65.37	65.03	64.49	63.23	63.26	65.43	66.01	65.46		
標準偏差	14.04	11.64	12.51	12.92	12.76	12.39	12.15	12.27	12.52	13.58	12.48	12.69	12.49		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査