

表 3265 透析前収縮期血圧(mmHg) 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

原疾患	60未満	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 （％）	7 (0.0)	39 (0.2)	384 (2.3)	1,471 (8.9)	4,003 (24.2)	5,540 (33.5)	3,684 (22.3)	1,131 (6.8)	252 (1.5)	43 (0.3)	16,554 (100.0)	908	17,462	147.58	24.03
慢性腎盂腎炎 （％）	1 (0.2)	2 (0.4)	13 (2.8)	49 (10.7)	107 (23.3)	149 (32.4)	92 (20.0)	40 (8.7)	5 (1.1)	2 (0.4)	460 (100.0)	24	484	146.96	25.70
急速進行性糸球 体腎炎 （％）			12 (3.5)	31 (9.1)	89 (26.2)	109 (32.1)	69 (20.3)	25 (7.4)	4 (1.2)	1 (0.3)	340 (100.0)	13	353	146.20	24.14
妊娠腎/妊娠中毒 症 （％）		4 (1.1)	10 (2.7)	34 (9.1)	79 (21.1)	129 (34.4)	79 (21.1)	35 (9.3)	4 (1.1)	1 (0.3)	375 (100.0)	26	401	148.07	25.21
その他の分類不 能の腎炎 （％）		1 (0.4)	3 (1.2)	23 (9.3)	58 (23.6)	81 (32.9)	59 (24.0)	15 (6.1)	5 (2.0)	1 (0.4)	246 (100.0)	15	261	148.44	24.15
多発性嚢胞腎 （％）		5 (0.3)	32 (1.8)	164 (9.1)	493 (27.3)	627 (34.8)	376 (20.8)	85 (4.7)	18 (1.0)	4 (0.2)	1,804 (100.0)	76	1,880	145.43	22.65
腎硬化症 （％）		9 (0.3)	60 (1.7)	309 (8.6)	821 (22.8)	1,176 (32.7)	830 (23.1)	316 (8.8)	64 (1.8)	14 (0.4)	3,599 (100.0)	221	3,820	149.64	24.35
悪性高血圧 （％）			1 (0.3)	19 (5.1)	81 (21.8)	117 (31.5)	97 (26.1)	48 (12.9)	6 (1.6)	3 (0.8)	372 (100.0)	19	391	154.27	23.08
糖尿病性腎症 （％）	1 (0.0)	12 (0.1)	151 (0.9)	745 (4.6)	2,512 (15.6)	4,919 (30.5)	4,478 (27.8)	2,360 (14.6)	756 (4.7)	178 (1.1)	16,112 (100.0)	848	16,960	158.93	25.35
SLE腎炎 （％）	2 (0.5)	4 (1.0)	10 (2.5)	38 (9.5)	99 (24.8)	120 (30.1)	89 (22.3)	32 (8.0)	4 (1.0)	1 (0.3)	399 (100.0)	27	426	145.86	25.97
アミロイド腎 （％）			5 (7.1)	15 (21.4)	14 (20.0)	20 (28.6)	11 (15.7)	3 (4.3)	2 (2.9)		70 (100.0)	4	74	138.76	26.46
痛風腎 （％）		1 (0.6)	2 (1.3)	16 (10.3)	37 (23.7)	47 (30.1)	40 (25.6)	12 (7.7)	1 (0.6)		156 (100.0)	10	166	147.47	24.25
先天性代謝異常 による腎不全 （％）		1 (2.1)	2 (4.3)	2 (4.3)	16 (34.0)	12 (25.5)	10 (21.3)	3 (6.4)	1 (2.1)		47 (100.0)	2	49	145.79	26.60
腎・尿路結核 （％）			1 (3.4)	4 (13.8)	7 (24.1)	7 (24.1)	8 (27.6)	1 (3.4)		1 (3.4)	29 (100.0)	2	31	146.76	27.91
腎・尿路結石 （％）			1 (1.3)	7 (9.2)	22 (28.9)	21 (27.6)	19 (25.0)	6 (7.9)			76 (100.0)	3	79	145.67	22.02
腎・尿路腫瘍 （％）			6 (5.3)	13 (11.5)	28 (24.8)	36 (31.9)	26 (23.0)	4 (3.5)			113 (100.0)	6	119	144.28	23.25
閉塞性尿路障害 （％）		1 (1.0)	2 (2.0)	10 (10.0)	24 (24.0)	34 (34.0)	18 (18.0)	9 (9.0)		2 (2.0)	100 (100.0)	4	104	146.74	26.76
骨髄腫 （％）			3 (9.7)	3 (9.7)	8 (25.8)	12 (38.7)	4 (12.9)	1 (3.2)			31 (100.0)	2	33	139.32	23.83
腎形成不全 （％）			3 (2.3)	19 (14.3)	37 (27.8)	44 (33.1)	19 (14.3)	9 (6.8)	1 (0.8)	1 (0.8)	133 (100.0)	3	136	142.86	24.95
不明 （％）		8 (0.2)	90 (2.1)	377 (8.6)	981 (22.5)	1,387 (31.8)	1,024 (23.5)	396 (9.1)	85 (1.9)	15 (0.3)	4,363 (100.0)	340	4,703	149.87	24.84
再導入 （％）		1 (0.2)	14 (3.1)	53 (11.6)	103 (22.5)	152 (33.2)	96 (21.0)	33 (7.2)	6 (1.3)		458 (100.0)	25	483	146.17	24.38
その他 （％）		3 (0.3)	34 (3.1)	111 (10.1)	255 (23.3)	353 (32.2)	240 (21.9)	78 (7.1)	17 (1.6)	4 (0.4)	1,095 (100.0)	65	1,160	146.67	24.70
合計 （％）	11 (0.0)	91 (0.2)	839 (1.8)	3,513 (7.5)	9,874 (21.0)	15,092 (32.2)	11,368 (24.2)	4,642 (9.9)	1,231 (2.6)	271 (0.6)	46,932 (100.0)	2,643	49,575	151.71	25.18
記載なし （％）						2 (33.3)	1 (16.7)	2 (33.3)	1 (16.7)		6 (100.0)		6	176.00	22.16
総計 （％）	11 (0.0)	91 (0.2)	839 (1.8)	3,513 (7.5)	9,874 (21.0)	15,094 (32.2)	11,369 (24.2)	4,644 (9.9)	1,232 (2.6)	271 (0.6)	46,938 (100.0)	2,643	49,581	151.71	25.18

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査