

表 3270 収縮期血圧(mmHg) 性別（腹膜透析患者）

性別	60未満	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)		12 (0.3)	108 (3.1)	359 (10.4)	1,122 (32.6)	1,148 (33.3)	515 (14.9)	138 (4.0)	37 (1.1)	8 (0.2)	3,447 (100.0)	2,227	5,674	141.86	22.65
女性 (%)		8 (0.4)	61 (3.3)	261 (14.0)	601 (32.2)	566 (30.3)	285 (15.3)	71 (3.8)	10 (0.5)	3 (0.2)	1,866 (100.0)	1,229	3,095	139.77	23.10
合計 (%)		20 (0.4)	169 (3.2)	620 (11.7)	1,723 (32.4)	1,714 (32.3)	800 (15.1)	209 (3.9)	47 (0.9)	11 (0.2)	5,313 (100.0)	3,456	8,769	141.13	22.83
記載なし (%)															
総計 (%)		20 (0.4)	169 (3.2)	620 (11.7)	1,723 (32.4)	1,714 (32.3)	800 (15.1)	209 (3.9)	47 (0.9)	11 (0.2)	5,313 (100.0)	3,456	8,769	141.13	22.83

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査