

表 3271 収縮期血圧(mmHg) 年齢(歳)別(腹膜透析患者)

年齢	60未満	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)		2 (3.4)	18 (30.5)	22 (37.3)	13 (22.0)	4 (6.8)					59 (100.0)	30	89	108.86	18.75
15歳～ (%)			3 (4.7)	18 (28.1)	17 (26.6)	17 (26.6)	7 (10.9)	2 (3.1)			64 (100.0)	37	101	132.56	24.41
30歳～ (%)			14 (3.6)	38 (9.6)	132 (33.5)	123 (31.2)	60 (15.2)	21 (5.3)	5 (1.3)	1 (0.3)	394 (100.0)	266	660	143.15	22.97
45歳～ (%)		1 (0.1)	27 (1.9)	129 (9.0)	419 (29.2)	505 (35.2)	250 (17.4)	82 (5.7)	18 (1.3)	5 (0.3)	1,436 (100.0)	884	2,320	145.17	22.57
60歳～ (%)		8 (0.3)	54 (2.3)	259 (11.1)	789 (33.8)	766 (32.8)	349 (15.0)	82 (3.5)	20 (0.9)	5 (0.2)	2,332 (100.0)	1,491	3,823	141.47	21.95
75歳～ (%)		7 (0.7)	47 (4.9)	147 (15.2)	335 (34.6)	281 (29.0)	126 (13.0)	21 (2.2)	4 (0.4)		968 (100.0)	681	1,649	136.49	22.61
90歳～ (%)		2 (3.3)	6 (10.0)	7 (11.7)	18 (30.0)	18 (30.0)	8 (13.3)	1 (1.7)			60 (100.0)	67	127	133.10	25.16
合計 (%)		20 (0.4)	169 (3.2)	620 (11.7)	1,723 (32.4)	1,714 (32.3)	800 (15.1)	209 (3.9)	47 (0.9)	11 (0.2)	5,313 (100.0)	3,456	8,769	141.13	22.83
不明 (%)															
記載なし (%)															
総計 (%)		20 (0.4)	169 (3.2)	620 (11.7)	1,723 (32.4)	1,714 (32.3)	800 (15.1)	209 (3.9)	47 (0.9)	11 (0.2)	5,313 (100.0)	3,456	8,769	141.13	22.83
平均		67.20	59.85	62.37	63.43	62.56	62.23	58.91	59.38	56.73	62.52	63.24	62.80		
標準偏差		24.30	24.46	18.22	14.09	13.02	12.63	12.52	11.73	9.34	14.54	14.62	14.58		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査