

表 3272 収縮期血圧(mmHg) 透析歴(年)別 (腹膜透析患者)

| 透析歴         | 60未満 | 60～         | 80～          | 100～          | 120～            | 140～            | 160～          | 180～         | 200～        | 220～        | 合計               | 記載なし  | 総計    | 平均     | 標準偏差  |
|-------------|------|-------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------------|-------|-------|--------|-------|
| 2年未満<br>(%) |      | 4<br>(0.2)  | 68<br>(3.3)  | 255<br>(12.2) | 712<br>(34.1)   | 671<br>(32.1)   | 289<br>(13.8) | 69<br>(3.3)  | 19<br>(0.9) | 3<br>(0.1)  | 2,090<br>(100.0) | 1,590 | 3,680 | 140.11 | 22.27 |
| 2年～<br>(%)  |      | 7<br>(0.4)  | 62<br>(3.3)  | 208<br>(10.9) | 608<br>(31.9)   | 631<br>(33.1)   | 285<br>(14.9) | 80<br>(4.2)  | 19<br>(1.0) | 7<br>(0.4)  | 1,907<br>(100.0) | 1,195 | 3,102 | 141.90 | 23.07 |
| 5年～<br>(%)  |      | 6<br>(0.6)  | 28<br>(2.8)  | 102<br>(10.3) | 307<br>(31.0)   | 324<br>(32.7)   | 165<br>(16.6) | 51<br>(5.1)  | 7<br>(0.7)  | 1<br>(0.1)  | 991<br>(100.0)   | 529   | 1,520 | 142.53 | 22.95 |
| 10年～<br>(%) |      | 2<br>(0.9)  | 6<br>(2.6)   | 35<br>(15.1)  | 67<br>(28.9)    | 70<br>(30.2)    | 42<br>(18.1)  | 8<br>(3.4)   | 2<br>(0.9)  |             | 232<br>(100.0)   | 82    | 314   | 140.82 | 23.85 |
| 15年～<br>(%) |      | 1<br>(1.6)  | 2<br>(3.3)   | 9<br>(14.8)   | 23<br>(37.7)    | 14<br>(23.0)    | 11<br>(18.0)  | 1<br>(1.6)   |             |             | 61<br>(100.0)    | 26    | 87    | 135.02 | 22.72 |
| 20年～<br>(%) |      |             | 1<br>(5.9)   | 7<br>(41.2)   | 3<br>(17.6)     | 3<br>(17.6)     | 3<br>(17.6)   |              |             |             | 17<br>(100.0)    | 9     | 26    | 129.76 | 24.49 |
| 25年～<br>(%) |      |             | 1<br>(20.0)  | 1<br>(20.0)   | 1<br>(20.0)     |                 | 2<br>(40.0)   |              |             |             | 5<br>(100.0)     | 7     | 12    | 133.80 | 40.52 |
| 30年～<br>(%) |      |             |              | 2<br>(66.7)   |                 |                 | 1<br>(33.3)   |              |             |             | 3<br>(100.0)     | 3     | 6     | 125.33 | 30.29 |
| 35年～<br>(%) |      |             |              |               | 1<br>(50.0)     | 1<br>(50.0)     |               |              |             |             | 2<br>(100.0)     |       | 2     | 140.50 | 9.19  |
| 40年～<br>(%) |      |             |              | 1<br>(100.0)  |                 |                 |               |              |             |             | 1<br>(100.0)     | 1     | 2     | 119.00 |       |
| 合計<br>(%)   |      | 20<br>(0.4) | 168<br>(3.2) | 620<br>(11.7) | 1,722<br>(32.4) | 1,714<br>(32.3) | 798<br>(15.0) | 209<br>(3.9) | 47<br>(0.9) | 11<br>(0.2) | 5,309<br>(100.0) | 3,442 | 8,751 | 141.13 | 22.82 |
| 不明<br>(%)   |      |             | 1<br>(25.0)  |               | 1<br>(25.0)     |                 | 2<br>(50.0)   |              |             |             | 4<br>(100.0)     | 14    | 18    | 140.00 | 38.15 |
| 記載なし<br>(%) |      |             |              |               |                 |                 |               |              |             |             |                  |       |       |        |       |
| 総計<br>(%)   |      | 20<br>(0.4) | 169<br>(3.2) | 620<br>(11.7) | 1,723<br>(32.4) | 1,714<br>(32.3) | 800<br>(15.1) | 209<br>(3.9) | 47<br>(0.9) | 11<br>(0.2) | 5,313<br>(100.0) | 3,456 | 8,769 | 141.13 | 22.83 |
| 平均          |      | 5.05        | 3.05         | 3.48          | 3.05            | 3.11            | 3.50          | 3.31         | 2.74        | 2.64        | 3.20             | 2.67  | 2.99  |        |       |
| 標準偏差        |      | 4.39        | 3.81         | 4.57          | 3.49            | 3.35            | 3.86          | 3.04         | 2.73        | 1.57        | 3.64             | 3.39  | 3.55  |        |       |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査