

表 3273 収縮期血圧(mmHg) 原疾患別（腹膜透析患者）

原疾患	60未満	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 （％）		7 (0.4)	41 (2.3)	197 (11.0)	633 (35.5)	573 (32.1)	261 (14.6)	61 (3.4)	9 (0.5)	1 (0.1)	1,783 (100.0)	1,047	2,830	140.70	21.25
慢性腎盂腎炎 （％）		1 (1.4)	6 (8.1)	12 (16.2)	23 (31.1)	23 (31.1)	7 (9.5)	2 (2.7)			74 (100.0)	23	97	133.89	24.46
急速進行性糸球 体腎炎 （％）			1 (2.4)	6 (14.6)	13 (31.7)	18 (43.9)	2 (4.9)	1 (2.4)			41 (100.0)	25	66	137.56	17.92
妊娠腎/妊娠中毒 症 （％）			1 (4.0)	4 (16.0)	7 (28.0)	7 (28.0)	5 (20.0)			1 (4.0)	25 (100.0)	2	27	140.16	26.46
その他の分類不 能の腎炎 （％）			1 (2.0)	10 (20.4)	16 (32.7)	17 (34.7)	4 (8.2)		1 (2.0)		49 (100.0)	29	78	134.98	20.53
多発性嚢胞腎 （％）		1 (0.6)	5 (3.2)	31 (19.6)	54 (34.2)	49 (31.0)	11 (7.0)	7 (4.4)			158 (100.0)	105	263	134.78	21.22
腎硬化症 （％）		5 (0.8)	26 (3.9)	73 (11.0)	220 (33.1)	221 (33.2)	95 (14.3)	20 (3.0)	4 (0.6)	1 (0.2)	665 (100.0)	430	1,095	139.69	22.65
悪性高血圧 （％）				7 (13.2)	20 (37.7)	14 (26.4)	9 (17.0)		3 (5.7)		53 (100.0)	54	107	143.96	23.02
糖尿病性腎症 （％）			39 (2.4)	147 (8.9)	495 (30.1)	537 (32.7)	302 (18.4)	89 (5.4)	26 (1.6)	8 (0.5)	1,643 (100.0)	1,156	2,799	145.35	23.49
SLE腎炎 （％）		1 (3.8)	1 (3.8)	4 (15.4)	6 (23.1)	13 (50.0)	1 (3.8)				26 (100.0)	20	46	134.38	22.47
アミロイド腎 （％）					1 (11.1)	5 (55.6)	2 (22.2)	1 (11.1)			9 (100.0)	6	15	151.33	18.10
痛風腎 （％）			2 (9.5)	2 (9.5)	4 (19.0)	10 (47.6)	2 (9.5)	1 (4.8)			21 (100.0)	11	32	139.05	25.04
先天性代謝異常 による腎不全 （％）				3 (27.3)	4 (36.4)	4 (36.4)					11 (100.0)	6	17	134.91	20.20
腎・尿路結核 （％）												2	2		
腎・尿路結石 （％）				5 (35.7)	5 (35.7)	1 (7.1)	2 (14.3)	1 (7.1)			14 (100.0)	7	21	133.07	25.20
腎・尿路腫瘍 （％）			1 (9.1)	2 (18.2)	1 (9.1)	4 (36.4)	2 (18.2)	1 (9.1)			11 (100.0)	3	14	139.55	28.73
閉塞性尿路障害 （％）			1 (8.3)	5 (41.7)	2 (16.7)	1 (8.3)	1 (8.3)	2 (16.7)			12 (100.0)	9	21	132.17	32.54
骨髄腫 （％）			1 (25.0)		3 (75.0)						4 (100.0)	3	7	116.75	17.00
腎形成不全 （％）			8 (17.8)	18 (40.0)	7 (15.6)	9 (20.0)	3 (6.7)				45 (100.0)	27	72	121.64	24.36
不明 （％）		2 (0.4)	18 (3.8)	51 (10.6)	156 (32.6)	156 (32.6)	76 (15.9)	16 (3.3)	4 (0.8)		479 (100.0)	363	842	140.93	22.39
再導入 （％）				6 (25.0)	6 (25.0)	9 (37.5)	2 (8.3)	1 (4.2)			24 (100.0)	31	55	137.33	21.62
その他 （％）		3 (1.8)	17 (10.2)	37 (22.3)	47 (28.3)	43 (25.9)	13 (7.8)	6 (3.6)			166 (100.0)	97	263	130.37	24.53
合計 （％）		20 (0.4)	169 (3.2)	620 (11.7)	1,723 (32.4)	1,714 (32.3)	800 (15.1)	209 (3.9)	47 (0.9)	11 (0.2)	5,313 (100.0)	3,456	8,769	141.13	22.83
記載なし （％）															
総計 （％）		20 (0.4)	169 (3.2)	620 (11.7)	1,723 (32.4)	1,714 (32.3)	800 (15.1)	209 (3.9)	47 (0.9)	11 (0.2)	5,313 (100.0)	3,456	8,769	141.13	22.83

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査