

表 3278 透析前拡張期血圧(mmHg) 治療方法別（透析患者全体）

治療方法	20未満	20～	40～	60～	80～	90～	100～	120～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析 (%)	76 (0.0)	688 (0.3)	18,943 (8.7)	101,499 (46.5)	53,056 (24.3)	28,740 (13.2)	14,097 (6.5)	922 (0.4)	66 (0.0)	218,087 (100.0)	30,638	248,725	77.64	14.46
血液透析濾過 (%)	18 (0.0)	167 (0.3)	3,630 (7.6)	20,226 (42.2)	12,272 (25.6)	7,348 (15.3)	4,020 (8.4)	271 (0.6)	15 (0.0)	47,967 (100.0)	5,809	53,776	79.49	14.86
血液濾過 (%)			2 (18.2)	5 (45.5)	3 (27.3)	1 (9.1)				11 (100.0)	5	16	74.64	15.52
血液吸着透析 (%)	1 (0.1)	21 (1.7)	165 (13.3)	619 (49.8)	267 (21.5)	113 (9.1)	51 (4.1)	4 (0.3)	2 (0.2)	1,243 (100.0)	133	1,376	73.93	15.40
在宅血液透析 (%)			21 (5.9)	144 (40.2)	98 (27.4)	58 (16.2)	33 (9.2)	4 (1.1)		358 (100.0)	197	555	80.69	14.41
腹膜透析 (%)	3 (0.1)	6 (0.1)	380 (7.2)	2,247 (42.6)	1,378 (26.1)	820 (15.5)	418 (7.9)	26 (0.5)	1 (0.0)	5,279 (100.0)	3,490	8,769	79.24	14.62
合計 (%)	98 (0.0)	882 (0.3)	23,141 (8.5)	124,740 (45.7)	67,074 (24.6)	37,080 (13.6)	18,619 (6.8)	1,227 (0.4)	84 (0.0)	272,945 (100.0)	40,272	313,217	77.99	14.56
記載なし (%)														
総計 (%)	98 (0.0)	882 (0.3)	23,141 (8.5)	124,740 (45.7)	67,074 (24.6)	37,080 (13.6)	18,619 (6.8)	1,227 (0.4)	84 (0.0)	272,945 (100.0)	40,272	313,217	77.99	14.56

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査