

表 3288 透析前拡張期血圧(mmHg) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

性別	20未満	20～	40～	60～	80～	90～	100～	120～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	54 (0.0)	318 (0.2)	10,214 (7.5)	61,305 (45.2)	33,885 (25.0)	19,287 (14.2)	9,835 (7.3)	667 (0.5)	41 (0.0)	135,606 (100.0)	8,834	144,440	78.61	14.43
女性 (%)	22 (0.0)	335 (0.4)	7,919 (10.6)	36,374 (48.7)	17,320 (23.2)	8,551 (11.5)	3,877 (5.2)	230 (0.3)	24 (0.0)	74,652 (100.0)	4,760	79,412	76.05	14.37
合計 (%)	76 (0.0)	653 (0.3)	18,133 (8.6)	97,679 (46.5)	51,205 (24.4)	27,838 (13.2)	13,712 (6.5)	897 (0.4)	65 (0.0)	210,258 (100.0)	13,594	223,852	77.70	14.46
記載なし (%)														
総計 (%)	76 (0.0)	653 (0.3)	18,133 (8.6)	97,679 (46.5)	51,205 (24.4)	27,838 (13.2)	13,712 (6.5)	897 (0.4)	65 (0.0)	210,258 (100.0)	13,594	223,852	77.70	14.46

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査