

表 3295 透析前拡張期血圧(mmHg) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

性別	20未満	20～	40～	60～	80～	90～	100～	120～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 （％）	11 (0.0)	80 (0.3)	1,941 (6.5)	12,128 (40.5)	7,811 (26.1)	4,884 (16.3)	2,874 (9.6)	194 (0.6)	11 (0.0)	29,934 (100.0)	1,696	31,630	80.56	14.85
女性 （％）	7 (0.0)	85 (0.5)	1,600 (9.4)	7,613 (44.9)	4,168 (24.6)	2,313 (13.7)	1,083 (6.4)	71 (0.4)	4 (0.0)	16,944 (100.0)	1,007	17,951	77.67	14.73
合計 （％）	18 (0.0)	165 (0.4)	3,541 (7.6)	19,741 (42.1)	11,979 (25.6)	7,197 (15.4)	3,957 (8.4)	265 (0.6)	15 (0.0)	46,878 (100.0)	2,703	49,581	79.52	14.87
記載なし （％）														
総計 （％）	18 (0.0)	165 (0.4)	3,541 (7.6)	19,741 (42.1)	11,979 (25.6)	7,197 (15.4)	3,957 (8.4)	265 (0.6)	15 (0.0)	46,878 (100.0)	2,703	49,581	79.52	14.87

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査