

表 3297 透析前拡張期血圧(mmHg) 透析歴(年)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析歴	20未満	20～	40～	60～	80～	90～	100～	120～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)	1 (0.0)	11 (0.2)	516 (8.5)	2,643 (43.6)	1,523 (25.1)	860 (14.2)	469 (7.7)	38 (0.6)	5 (0.1)	6,066 (100.0)	339	6,405	78.95	14.86
2年～ (%)	4 (0.0)	30 (0.3)	734 (7.0)	4,397 (41.9)	2,641 (25.1)	1,629 (15.5)	994 (9.5)	68 (0.6)	4 (0.0)	10,501 (100.0)	568	11,069	80.13	15.00
5年～ (%)	5 (0.0)	42 (0.3)	843 (7.0)	4,853 (40.4)	3,142 (26.1)	1,963 (16.3)	1,091 (9.1)	80 (0.7)	4 (0.0)	12,023 (100.0)	751	12,774	80.28	14.93
10年～ (%)	2 (0.0)	22 (0.3)	460 (6.4)	2,982 (41.6)	1,857 (25.9)	1,160 (16.2)	641 (8.9)	39 (0.5)		7,163 (100.0)	400	7,563	80.09	14.64
15年～ (%)	3 (0.1)	14 (0.3)	279 (6.3)	1,810 (40.6)	1,223 (27.4)	720 (16.1)	393 (8.8)	19 (0.4)		4,461 (100.0)	235	4,696	80.14	14.44
20年～ (%)	1 (0.0)	9 (0.3)	216 (7.5)	1,246 (43.1)	753 (26.1)	444 (15.4)	202 (7.0)	15 (0.5)	2 (0.1)	2,888 (100.0)	170	3,058	79.09	14.25
25年～ (%)	1 (0.1)	13 (0.7)	188 (10.3)	847 (46.5)	422 (23.2)	241 (13.2)	106 (5.8)	3 (0.2)		1,821 (100.0)	109	1,930	76.77	14.52
30年～ (%)		10 (0.9)	143 (13.0)	540 (49.0)	255 (23.2)	117 (10.6)	35 (3.2)	1 (0.1)		1,101 (100.0)	96	1,197	74.34	14.49
35年～ (%)		8 (1.3)	114 (18.6)	296 (48.4)	127 (20.8)	47 (7.7)	20 (3.3)			612 (100.0)	26	638	71.55	14.96
40年～ (%)	1 (0.5)	5 (2.6)	44 (23.3)	102 (54.0)	23 (12.2)	9 (4.8)	5 (2.6)			189 (100.0)	8	197	68.34	16.03
合計 (%)	18 (0.0)	164 (0.4)	3,537 (7.6)	19,716 (42.1)	11,966 (25.6)	7,190 (15.4)	3,956 (8.4)	263 (0.6)	15 (0.0)	46,825 (100.0)	2,702	49,527	79.52	14.87
不明 (%)		1 (1.9)	4 (7.5)	25 (47.2)	13 (24.5)	7 (13.2)	1 (1.9)	2 (3.8)		53 (100.0)	1	54	77.91	16.39
記載なし (%)														
総計 (%)	18 (0.0)	165 (0.4)	3,541 (7.6)	19,741 (42.1)	11,979 (25.6)	7,197 (15.4)	3,957 (8.4)	265 (0.6)	15 (0.0)	46,878 (100.0)	2,703	49,581	79.52	14.87
平均	11.28	13.62	10.94	9.90	9.53	9.24	8.61	7.50	5.73	9.67	9.86	9.68		
標準偏差	10.52	11.74	10.45	9.04	8.33	7.90	7.34	6.41	6.63	8.70	8.83	8.71		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査