

表 3298 透析前拡張期血圧(mmHg) 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

原疾患	20未満	20～	40～	60～	80～	90～	100～	120～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 （％）	6 (0.0)	64 (0.4)	1,206 (7.3)	6,868 (41.6)	4,319 (26.1)	2,611 (15.8)	1,360 (8.2)	81 (0.5)	3 (0.0)	16,518 (100.0)	944	17,462	79.62	14.71
慢性腎盂腎炎 （％）	1 (0.2)	2 (0.4)	38 (8.3)	183 (39.8)	118 (25.7)	76 (16.5)	41 (8.9)	1 (0.2)		460 (100.0)	24	484	79.48	15.08
急速進行性糸球 体腎炎 （％）			29 (8.5)	165 (48.5)	82 (24.1)	36 (10.6)	25 (7.4)	3 (0.9)		340 (100.0)	13	353	78.19	14.62
妊娠腎/妊娠中毒 症 （％）	1 (0.3)	3 (0.8)	22 (5.9)	155 (41.3)	99 (26.4)	59 (15.7)	34 (9.1)	2 (0.5)		375 (100.0)	26	401	79.83	15.50
その他の分類不 能の腎炎 （％）		1 (0.4)	15 (6.1)	92 (37.4)	67 (27.2)	43 (17.5)	28 (11.4)			246 (100.0)	15	261	81.89	14.24
多発性嚢胞腎 （％）		4 (0.2)	103 (5.7)	717 (39.8)	521 (28.9)	307 (17.0)	144 (8.0)	5 (0.3)		1,801 (100.0)	79	1,880	80.55	13.57
腎硬化症 （％）	2 (0.1)	18 (0.5)	368 (10.2)	1,594 (44.4)	852 (23.7)	497 (13.8)	240 (6.7)	22 (0.6)	1 (0.0)	3,594 (100.0)	226	3,820	77.56	15.20
悪性高血圧 （％）		2 (0.5)	19 (5.1)	107 (28.8)	111 (29.9)	66 (17.8)	61 (16.4)	5 (1.3)		371 (100.0)	20	391	84.75	15.69
糖尿病性腎症 （％）	4 (0.0)	42 (0.3)	1,188 (7.4)	6,901 (42.9)	4,038 (25.1)	2,409 (15.0)	1,415 (8.8)	97 (0.6)	11 (0.1)	16,105 (100.0)	855	16,960	79.57	14.91
SLE腎炎 （％）		3 (0.8)	34 (8.6)	157 (39.6)	96 (24.2)	54 (13.6)	48 (12.1)	4 (1.0)		396 (100.0)	30	426	80.17	16.30
アミロイド腎 （％）		2 (2.9)	10 (14.3)	27 (38.6)	18 (25.7)	9 (12.9)	3 (4.3)	1 (1.4)		70 (100.0)	4	74	75.30	16.17
痛風腎 （％）		1 (0.6)	9 (5.8)	69 (44.5)	46 (29.7)	18 (11.6)	12 (7.7)			155 (100.0)	11	166	79.11	13.31
先天性代謝異常 による腎不全 （％）			3 (6.4)	14 (29.8)	13 (27.7)	13 (27.7)	4 (8.5)			47 (100.0)	2	49	83.57	14.67
腎・尿路結核 （％）			4 (13.8)	16 (55.2)	5 (17.2)	3 (10.3)	1 (3.4)			29 (100.0)	2	31	75.86	11.63
腎・尿路結石 （％）			7 (9.2)	32 (42.1)	22 (28.9)	11 (14.5)	4 (5.3)			76 (100.0)	3	79	78.51	14.43
腎・尿路腫瘍 （％）			9 (8.0)	53 (46.9)	29 (25.7)	15 (13.3)	6 (5.3)	1 (0.9)		113 (100.0)	6	119	77.60	14.26
閉塞性尿路障害 （％）			8 (8.0)	43 (43.0)	21 (21.0)	21 (21.0)	7 (7.0)			100 (100.0)	4	104	79.42	14.59
骨髄腫 （％）			6 (19.4)	10 (32.3)	9 (29.0)	5 (16.1)	1 (3.2)			31 (100.0)	2	33	75.45	15.29
腎形成不全 （％）			6 (4.5)	49 (36.8)	34 (25.6)	27 (20.3)	14 (10.5)	3 (2.3)		133 (100.0)	3	136	83.43	15.55
不明 （％）	4 (0.1)	16 (0.4)	324 (7.4)	1,862 (42.7)	1,108 (25.4)	656 (15.0)	361 (8.3)	30 (0.7)		4,361 (100.0)	342	4,703	79.51	14.98
再導入 （％）		3 (0.7)	28 (6.2)	169 (37.1)	103 (22.6)	96 (21.1)	54 (11.9)	2 (0.4)		455 (100.0)	28	483	81.51	15.71
その他 （％）		4 (0.4)	105 (9.6)	457 (41.7)	267 (24.4)	163 (14.9)	92 (8.4)	8 (0.7)		1,096 (100.0)	64	1,160	79.10	15.25
合計 （％）	18 (0.0)	165 (0.4)	3,541 (7.6)	19,740 (42.1)	11,978 (25.6)	7,195 (15.4)	3,955 (8.4)	265 (0.6)	15 (0.0)	46,872 (100.0)	2,703	49,575	79.52	14.87
記載なし （％）				1 (16.7)	1 (16.7)	2 (33.3)	2 (33.3)			6 (100.0)		6	94.33	13.50
総計 （％）	18 (0.0)	165 (0.4)	3,541 (7.6)	19,741 (42.1)	11,979 (25.6)	7,197 (15.4)	3,957 (8.4)	265 (0.6)	15 (0.0)	46,878 (100.0)	2,703	49,581	79.52	14.87

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査