

表 3309 透析前脈拍(拍/分) 治療方法別 (透析患者全体)

治療方法	40未満	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析 (%)	172 (0.1)	2,351 (1.1)	18,743 (8.9)	56,893 (26.9)	66,714 (31.5)	41,850 (19.8)	17,658 (8.3)	5,439 (2.6)	1,283 (0.6)	511 (0.2)	211,614 (100.0)	37,111	248,725	74.26	12.70
血液透析濾過 (%)	32 (0.1)	432 (0.9)	3,724 (7.9)	11,912 (25.4)	14,742 (31.4)	9,979 (21.3)	4,319 (9.2)	1,298 (2.8)	344 (0.7)	146 (0.3)	46,928 (100.0)	6,848	53,776	75.21	12.76
血液濾過 (%)				3 (27.3)	5 (45.5)	2 (18.2)	1 (9.1)				11 (100.0)	5	16	74.64	10.82
血液吸着透析 (%)	2 (0.2)	10 (0.8)	94 (7.7)	345 (28.3)	382 (31.3)	226 (18.5)	110 (9.0)	40 (3.3)	7 (0.6)	3 (0.2)	1,219 (100.0)	157	1,376	74.54	12.86
在宅血液透析 (%)		1 (0.3)	12 (3.7)	63 (19.6)	96 (29.9)	76 (23.7)	41 (12.8)	27 (8.4)	4 (1.2)	1 (0.3)	321 (100.0)	234	555	79.23	13.45
腹膜透析 (%)		23 (0.5)	233 (5.3)	876 (19.9)	1,304 (29.6)	1,127 (25.6)	571 (13.0)	194 (4.4)	50 (1.1)	25 (0.6)	4,403 (100.0)	4,366	8,769	78.29	13.16
合計 (%)	206 (0.1)	2,817 (1.1)	22,806 (8.6)	70,092 (26.5)	83,243 (31.5)	53,260 (20.1)	22,700 (8.6)	6,998 (2.6)	1,688 (0.6)	686 (0.3)	264,496 (100.0)	48,721	313,217	74.50	12.74
記載なし (%)															
総計 (%)	206 (0.1)	2,817 (1.1)	22,806 (8.6)	70,092 (26.5)	83,243 (31.5)	53,260 (20.1)	22,700 (8.6)	6,998 (2.6)	1,688 (0.6)	686 (0.3)	264,496 (100.0)	48,721	313,217	74.50	12.74

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査