

表 3315 透析前脈拍(拍/分) 原疾患別 (透析患者全体)

原疾患	40未満	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	52 (0.1)	836 (1.1)	7,149 (9.1)	22,271 (28.3)	25,255 (32.1)	14,679 (18.7)	5,895 (7.5)	1,809 (2.3)	466 (0.6)	209 (0.3)	78,621 (100.0)	14,726	93,347	73.73	12.46
慢性腎盂腎炎 (%)		22 (0.9)	199 (7.9)	655 (25.9)	831 (32.8)	482 (19.0)	243 (9.6)	82 (3.2)	16 (0.6)	3 (0.1)	2,533 (100.0)	402	2,935	75.01	12.60
急速進行性糸球 体腎炎 (%)		18 (0.9)	150 (7.1)	546 (26.0)	692 (32.9)	404 (19.2)	194 (9.2)	74 (3.5)	17 (0.8)	8 (0.4)	2,103 (100.0)	375	2,478	75.42	13.14
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)		10 (0.7)	95 (7.0)	356 (26.3)	456 (33.7)	275 (20.3)	109 (8.1)	34 (2.5)	12 (0.9)	7 (0.5)	1,354 (100.0)	191	1,545	75.08	12.57
その他の分類不 能の腎炎 (%)	2 (0.2)	10 (0.8)	75 (6.2)	322 (26.7)	410 (34.0)	236 (19.6)	105 (8.7)	37 (3.1)	6 (0.5)	3 (0.2)	1,206 (100.0)	199	1,405	74.87	12.44
多発性嚢胞腎 (%)	6 (0.1)	85 (0.9)	949 (9.9)	2,873 (29.9)	3,032 (31.6)	1,725 (18.0)	669 (7.0)	211 (2.2)	37 (0.4)	23 (0.2)	9,610 (100.0)	1,646	11,256	73.22	12.51
腎硬化症 (%)	30 (0.1)	368 (1.5)	2,958 (11.7)	7,630 (30.2)	7,626 (30.2)	4,284 (17.0)	1,623 (6.4)	527 (2.1)	151 (0.6)	59 (0.2)	25,256 (100.0)	4,549	29,805	72.45	12.66
悪性高血圧 (%)	1 (0.0)	23 (1.0)	198 (9.0)	569 (25.9)	686 (31.3)	435 (19.8)	181 (8.2)	77 (3.5)	20 (0.9)	5 (0.2)	2,195 (100.0)	423	2,618	74.69	13.02
糖尿病性腎症 (%)	82 (0.1)	990 (1.0)	7,547 (7.4)	24,275 (23.9)	31,721 (31.2)	22,861 (22.5)	10,281 (10.1)	3,071 (3.0)	685 (0.7)	241 (0.2)	101,754 (100.0)	18,524	120,278	75.70	12.80
SLE腎炎 (%)	1 (0.1)	11 (0.6)	98 (5.2)	463 (24.6)	612 (32.6)	415 (22.1)	199 (10.6)	63 (3.4)	15 (0.8)	3 (0.2)	1,880 (100.0)	347	2,227	76.35	12.40
アミロイド腎 (%)	1 (0.3)	2 (0.5)	27 (7.0)	101 (26.4)	117 (30.5)	75 (19.6)	46 (12.0)	10 (2.6)	2 (0.5)	2 (0.5)	383 (100.0)	79	462	75.69	13.05
痛風腎 (%)		10 (1.1)	89 (9.6)	258 (27.9)	301 (32.6)	175 (18.9)	63 (6.8)	18 (1.9)	7 (0.8)	3 (0.3)	924 (100.0)	151	1,075	73.59	12.50
先天性代謝異常 による腎不全 (%)	1 (0.4)	3 (1.3)	10 (4.4)	56 (24.9)	74 (32.9)	51 (22.7)	20 (8.9)	4 (1.8)	3 (1.3)	3 (1.3)	225 (100.0)	49	274	76.42	13.73
腎・尿路結核 (%)		1 (0.6)	17 (10.6)	43 (26.7)	48 (29.8)	28 (17.4)	18 (11.2)	4 (2.5)		2 (1.2)	161 (100.0)	34	195	75.14	13.36
腎・尿路結石 (%)		6 (1.2)	41 (8.2)	131 (26.2)	181 (36.2)	92 (18.4)	30 (6.0)	14 (2.8)	3 (0.6)	2 (0.4)	500 (100.0)	81	581	74.17	13.61
腎・尿路腫瘍 (%)		13 (1.7)	82 (10.5)	228 (29.3)	222 (28.5)	154 (19.8)	53 (6.8)	13 (1.7)	8 (1.0)	5 (0.6)	778 (100.0)	132	910	73.41	13.24
閉塞性尿路障害 (%)		11 (1.8)	55 (8.9)	145 (23.4)	198 (31.9)	121 (19.5)	61 (9.8)	23 (3.7)	3 (0.5)	3 (0.5)	620 (100.0)	110	730	75.32	13.25
骨髄腫 (%)		2 (0.8)	25 (10.2)	52 (21.3)	64 (26.2)	65 (26.6)	24 (9.8)	7 (2.9)	4 (1.6)	1 (0.4)	244 (100.0)	47	291	76.31	13.63
腎形成不全 (%)	1 (0.2)	6 (1.1)	27 (4.9)	114 (20.8)	170 (31.0)	127 (23.2)	56 (10.2)	32 (5.8)	9 (1.6)	6 (1.1)	548 (100.0)	112	660	77.94	14.20
不明 (%)	17 (0.1)	299 (1.2)	2,291 (9.1)	6,875 (27.4)	7,886 (31.5)	4,807 (19.2)	2,031 (8.1)	634 (2.5)	154 (0.6)	61 (0.2)	25,055 (100.0)	4,842	29,897	74.03	12.70
再導入 (%)	4 (0.2)	12 (0.7)	113 (6.2)	448 (24.5)	566 (30.9)	407 (22.2)	191 (10.4)	64 (3.5)	21 (1.1)	4 (0.2)	1,830 (100.0)	353	2,183	76.36	12.91
その他 (%)	8 (0.1)	79 (1.2)	610 (9.1)	1,675 (25.0)	2,091 (31.2)	1,361 (20.3)	605 (9.0)	190 (2.8)	49 (0.7)	33 (0.5)	6,701 (100.0)	1,343	8,044	74.84	13.23
合計 (%)	206 (0.1)	2,817 (1.1)	22,805 (8.6)	70,086 (26.5)	83,239 (31.5)	53,259 (20.1)	22,697 (8.6)	6,998 (2.6)	1,688 (0.6)	686 (0.3)	264,481 (100.0)	48,715	313,196	74.51	12.74
記載なし (%)			1 (6.7)	6 (40.0)	4 (26.7)	1 (6.7)	3 (20.0)				15 (100.0)	6	21	73.87	11.42
総計 (%)	206 (0.1)	2,817 (1.1)	22,806 (8.6)	70,092 (26.5)	83,243 (31.5)	53,260 (20.1)	22,700 (8.6)	6,998 (2.6)	1,688 (0.6)	686 (0.3)	264,496 (100.0)	48,721	313,217	74.50	12.74

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査