

表 3321 透析前脈拍(拍/分) 原疾患別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

原疾患	40未満	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 （％）	42 (0.1)	656 (1.1)	5,390 (9.3)	16,737 (28.9)	18,559 (32.1)	10,547 (18.2)	4,181 (7.2)	1,277 (2.2)	320 (0.6)	143 (0.2)	57,852 (100.0)	5,622	63,474	73.42	12.41
慢性腎盂腎炎 （％）		16 (0.8)	143 (7.6)	509 (26.9)	637 (33.7)	345 (18.3)	168 (8.9)	57 (3.0)	13 (0.7)	2 (0.1)	1,890 (100.0)	150	2,040	74.60	12.35
急速進行性糸球 体腎炎 （％）		15 (0.9)	113 (6.9)	433 (26.4)	542 (33.0)	318 (19.4)	148 (9.0)	52 (3.2)	14 (0.9)	6 (0.4)	1,641 (100.0)	130	1,771	75.31	13.02
妊娠腎/妊娠中毒 症 （％）		8 (0.9)	70 (7.7)	234 (25.8)	311 (34.3)	179 (19.7)	74 (8.2)	20 (2.2)	8 (0.9)	3 (0.3)	907 (100.0)	74	981	74.66	12.45
その他の分類不 能の腎炎 （％）	2 (0.2)	6 (0.7)	55 (6.4)	228 (26.5)	300 (34.8)	165 (19.1)	74 (8.6)	24 (2.8)	5 (0.6)	3 (0.3)	862 (100.0)	67	929	74.77	12.54
多発性嚢胞腎 （％）	4 (0.1)	64 (0.9)	723 (9.9)	2,211 (30.2)	2,325 (31.8)	1,292 (17.7)	502 (6.9)	161 (2.2)	22 (0.3)	16 (0.2)	7,320 (100.0)	696	8,016	73.09	12.44
腎硬化症 （％）	24 (0.1)	307 (1.5)	2,421 (12.0)	6,170 (30.5)	6,104 (30.1)	3,361 (16.6)	1,280 (6.3)	418 (2.1)	126 (0.6)	41 (0.2)	20,252 (100.0)	1,755	22,007	72.28	12.65
悪性高血圧 （％）		19 (1.1)	158 (9.3)	466 (27.4)	517 (30.4)	327 (19.2)	137 (8.1)	59 (3.5)	14 (0.8)	4 (0.2)	1,701 (100.0)	160	1,861	74.33	12.99
糖尿病性腎症 （％）	71 (0.1)	807 (1.0)	6,197 (7.6)	19,701 (24.2)	25,569 (31.4)	18,029 (22.1)	8,025 (9.8)	2,388 (2.9)	531 (0.7)	184 (0.2)	81,502 (100.0)	7,924	89,426	75.49	12.78
SLE腎炎 （％）	1 (0.1)	5 (0.4)	69 (5.1)	329 (24.1)	457 (33.5)	305 (22.3)	148 (10.8)	39 (2.9)	11 (0.8)	2 (0.1)	1,366 (100.0)	138	1,504	76.39	12.12
アミロイド腎 （％）	1 (0.3)	2 (0.7)	20 (7.0)	79 (27.6)	86 (30.1)	53 (18.5)	33 (11.5)	9 (3.1)	1 (0.3)	2 (0.7)	286 (100.0)	28	314	75.47	13.53
痛風腎 （％）		7 (1.0)	74 (10.3)	198 (27.5)	244 (33.9)	132 (18.3)	47 (6.5)	13 (1.8)	4 (0.6)	1 (0.1)	720 (100.0)	58	778	73.15	11.84
先天性代謝異常 による腎不全 （％）	1 (0.6)	3 (1.9)	5 (3.1)	38 (23.6)	52 (32.3)	41 (25.5)	16 (9.9)	2 (1.2)	1 (0.6)	2 (1.2)	161 (100.0)	12	173	76.48	13.04
腎・尿路結核 （％）		1 (0.8)	14 (11.1)	34 (27.0)	37 (29.4)	24 (19.0)	11 (8.7)	3 (2.4)		2 (1.6)	126 (100.0)	15	141	74.81	13.54
腎・尿路結石 （％）		3 (0.8)	34 (8.7)	104 (26.5)	140 (35.7)	71 (18.1)	26 (6.6)	10 (2.6)	2 (0.5)	2 (0.5)	392 (100.0)	29	421	74.21	13.95
腎・尿路腫瘍 （％）		10 (1.6)	68 (10.8)	190 (30.2)	180 (28.6)	122 (19.4)	38 (6.0)	12 (1.9)	7 (1.1)	3 (0.5)	630 (100.0)	48	678	73.19	13.11
閉塞性尿路障害 （％）		6 (1.3)	40 (8.7)	110 (24.0)	150 (32.7)	88 (19.2)	47 (10.2)	14 (3.1)	2 (0.4)	2 (0.4)	459 (100.0)	35	494	75.14	12.67
骨髄腫 （％）		2 (1.1)	18 (10.2)	34 (19.2)	46 (26.0)	50 (28.2)	18 (10.2)	4 (2.3)	4 (2.3)	1 (0.6)	177 (100.0)	13	190	76.66	13.88
腎形成不全 （％）		5 (1.3)	20 (5.3)	86 (23.0)	123 (32.9)	75 (20.1)	35 (9.4)	22 (5.9)	5 (1.3)	3 (0.8)	374 (100.0)	26	400	76.80	13.90
不明 （％）	11 (0.1)	245 (1.3)	1,808 (9.4)	5,388 (28.1)	6,050 (31.6)	3,583 (18.7)	1,474 (7.7)	471 (2.5)	96 (0.5)	46 (0.2)	19,172 (100.0)	2,004	21,176	73.65	12.63
再導入 （％）	3 (0.2)	5 (0.4)	78 (6.2)	309 (24.4)	394 (31.1)	278 (21.9)	137 (10.8)	46 (3.6)	14 (1.1)	3 (0.2)	1,267 (100.0)	89	1,356	76.53	13.01
その他 （％）	8 (0.2)	65 (1.3)	496 (9.6)	1,345 (26.1)	1,585 (30.8)	1,008 (19.6)	449 (8.7)	140 (2.7)	35 (0.7)	21 (0.4)	5,152 (100.0)	563	5,715	74.34	13.11
合計 （％）	168 (0.1)	2,257 (1.1)	18,014 (8.8)	54,933 (26.9)	64,408 (31.5)	40,393 (19.8)	17,068 (8.4)	5,241 (2.6)	1,235 (0.6)	492 (0.2)	204,209 (100.0)	19,636	223,845	74.27	12.70
記載なし （％）				3 (50.0)	3 (50.0)						6 (100.0)	1	7	69.50	3.94
総計 （％）	168 (0.1)	2,257 (1.1)	18,014 (8.8)	54,936 (26.9)	64,411 (31.5)	40,393 (19.8)	17,068 (8.4)	5,241 (2.6)	1,235 (0.6)	492 (0.2)	204,215 (100.0)	19,637	223,852	74.27	12.70

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査