

表 3324 透析前脈拍(拍/分) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

性別	40未満	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	16	326	2,463	7,512	8,993	6,169	2,698	863	224	84	29,348	2,282	31,630	75.06	12.96
(%)	(0.1)	(1.1)	(8.4)	(25.6)	(30.6)	(21.0)	(9.2)	(2.9)	(0.8)	(0.3)	(100.0)				
女性	14	98	1,176	4,155	5,442	3,607	1,521	414	107	60	16,594	1,357	17,951	75.46	12.37
(%)	(0.1)	(0.6)	(7.1)	(25.0)	(32.8)	(21.7)	(9.2)	(2.5)	(0.6)	(0.4)	(100.0)				
合計	30	424	3,639	11,667	14,435	9,776	4,219	1,277	331	144	45,942	3,639	49,581	75.21	12.75
(%)	(0.1)	(0.9)	(7.9)	(25.4)	(31.4)	(21.3)	(9.2)	(2.8)	(0.7)	(0.3)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	30	424	3,639	11,667	14,435	9,776	4,219	1,277	331	144	45,942	3,639	49,581	75.21	12.75
(%)	(0.1)	(0.9)	(7.9)	(25.4)	(31.4)	(21.3)	(9.2)	(2.8)	(0.7)	(0.3)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査