

表 3327 透析前脈拍(拍/分) 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

原疾患	40未満	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 （％）	7 (0.0)	145 (0.9)	1,374 (8.5)	4,361 (27.1)	5,260 (32.6)	3,158 (19.6)	1,266 (7.9)	384 (2.4)	112 (0.7)	53 (0.3)	16,120 (100.0)	1,342	17,462	74.37	12.49
慢性腎盂腎炎 （％）		3 (0.7)	34 (7.6)	100 (22.3)	143 (31.8)	96 (21.4)	53 (11.8)	17 (3.8)	2 (0.4)	1 (0.2)	449 (100.0)	35	484	76.67	12.95
急速進行性糸球 体腎炎 （％）		3 (0.9)	24 (7.2)	87 (26.0)	111 (33.1)	60 (17.9)	31 (9.3)	17 (5.1)	1 (0.3)	1 (0.3)	335 (100.0)	18	353	75.46	13.49
妊娠腎/妊娠中毒 症 （％）		1 (0.3)	18 (4.9)	101 (27.3)	124 (33.5)	75 (20.3)	30 (8.1)	14 (3.8)	4 (1.1)	3 (0.8)	370 (100.0)	31	401	76.34	12.86
その他の分類不 能の腎炎 （％）		2 (0.8)	16 (6.5)	70 (28.6)	75 (30.6)	51 (20.8)	20 (8.2)	10 (4.1)	1 (0.4)		245 (100.0)	16	261	74.97	12.24
多発性嚢胞腎 （％）	2 (0.1)	19 (1.1)	173 (9.8)	529 (30.0)	554 (31.4)	325 (18.4)	117 (6.6)	32 (1.8)	10 (0.6)	3 (0.2)	1,764 (100.0)	116	1,880	73.14	12.38
腎硬化症 （％）	5 (0.1)	46 (1.3)	388 (11.0)	1,050 (29.8)	1,064 (30.2)	619 (17.6)	242 (6.9)	75 (2.1)	18 (0.5)	13 (0.4)	3,520 (100.0)	300	3,820	72.93	12.73
悪性高血圧 （％）	1 (0.3)	1 (0.3)	28 (7.7)	79 (21.8)	121 (33.4)	80 (22.1)	33 (9.1)	12 (3.3)	6 (1.7)	1 (0.3)	362 (100.0)	29	391	76.10	13.13
糖尿病性腎症 （％）	10 (0.1)	136 (0.9)	1,034 (6.5)	3,531 (22.3)	4,806 (30.4)	3,807 (24.1)	1,775 (11.2)	536 (3.4)	120 (0.8)	48 (0.3)	15,803 (100.0)	1,157	16,960	76.65	12.85
SLE腎炎 （％）		5 (1.3)	20 (5.1)	99 (25.4)	121 (31.1)	89 (22.9)	38 (9.8)	15 (3.9)	1 (0.3)	1 (0.3)	389 (100.0)	37	426	76.05	12.55
アミロイド腎 （％）			6 (8.6)	19 (27.1)	20 (28.6)	15 (21.4)	8 (11.4)	1 (1.4)	1 (1.4)		70 (100.0)	4	74	75.36	11.96
痛風腎 （％）		2 (1.3)	12 (7.7)	49 (31.6)	46 (29.7)	33 (21.3)	6 (3.9)	4 (2.6)	1 (0.6)	2 (1.3)	155 (100.0)	11	166	73.97	14.34
先天性代謝異常 による腎不全 （％）			4 (8.7)	13 (28.3)	17 (37.0)	7 (15.2)	3 (6.5)	1 (2.2)	1 (2.2)		46 (100.0)	3	49	74.87	13.08
腎・尿路結核 （％）			3 (11.1)	8 (29.6)	8 (29.6)	2 (7.4)	5 (18.5)	1 (3.7)			27 (100.0)	4	31	75.07	13.34
腎・尿路結石 （％）		3 (4.0)	4 (5.3)	17 (22.7)	30 (40.0)	15 (20.0)	3 (4.0)	2 (2.7)	1 (1.3)		75 (100.0)	4	79	74.25	12.64
腎・尿路腫瘍 （％）		1 (0.9)	9 (8.1)	29 (26.1)	31 (27.9)	27 (24.3)	11 (9.9)		1 (0.9)	2 (1.8)	111 (100.0)	8	119	75.17	13.45
閉塞性尿路障害 （％）		3 (3.0)	12 (12.1)	27 (27.3)	28 (28.3)	19 (19.2)	8 (8.1)	2 (2.0)			99 (100.0)	5	104	72.91	13.06
骨髄腫 （％）			1 (3.2)	9 (29.0)	10 (32.3)	7 (22.6)	4 (12.9)				31 (100.0)	2	33	75.10	11.43
腎形成不全 （％）	1 (0.8)	1 (0.8)	6 (4.6)	22 (16.9)	39 (30.0)	38 (29.2)	16 (12.3)	5 (3.8)	2 (1.5)		130 (100.0)	6	136	78.35	13.39
不明 （％）	3 (0.1)	38 (0.9)	362 (8.4)	1,120 (26.0)	1,336 (31.0)	899 (20.9)	393 (9.1)	110 (2.6)	37 (0.9)	11 (0.3)	4,309 (100.0)	394	4,703	75.10	12.71
再導入 （％）	1 (0.2)	7 (1.6)	28 (6.3)	112 (25.1)	134 (30.0)	105 (23.5)	42 (9.4)	14 (3.1)	3 (0.7)	1 (0.2)	447 (100.0)	36	483	75.57	12.39
その他 （％）		8 (0.7)	83 (7.7)	233 (21.6)	356 (33.0)	248 (23.0)	113 (10.5)	25 (2.3)	9 (0.8)	4 (0.4)	1,079 (100.0)	81	1,160	76.05	12.90
合計 （％）	30 (0.1)	424 (0.9)	3,639 (7.9)	11,665 (25.4)	14,434 (31.4)	9,775 (21.3)	4,217 (9.2)	1,277 (2.8)	331 (0.7)	144 (0.3)	45,936 (100.0)	3,639	49,575	75.20	12.75
記載なし （％）				2 (33.3)	1 (16.7)	1 (16.7)	2 (33.3)				6 (100.0)		6	79.83	12.73
総計 （％）	30 (0.1)	424 (0.9)	3,639 (7.9)	11,667 (25.4)	14,435 (31.4)	9,776 (21.3)	4,219 (9.2)	1,277 (2.8)	331 (0.7)	144 (0.3)	45,942 (100.0)	3,639	49,581	75.21	12.75

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査