

表 3374 使用透析液の種類 併用の状況別（腹膜透析患者）

併用の状況	1.5%液のみ	1.5%液と2.5%液の併用	2.5%液のみ	4.25%液のみ(イコデキストリンなし)	イコデキストリン単独(ブドウ糖使用なし)	1.5%+イコデキストリン	1.5%+2.5%+イコデキストリン	2.5%+イコデキストリン	4.25%液+イコデキストリン	合計	不明	記載なし	総計
HD(F)単独 (%)												1	1
PD単独 (%)	1,994 (42.6)	516 (11.0)	130 (2.8)	12 (0.3)	52 (1.1)	1,201 (25.6)	422 (9.0)	347 (7.4)	10 (0.2)	4,684 (100.0)	6	2,414	7,104
HD(F)単独,PDカテあり (%)													
PD,HD併用週1 HD(F) (%)	144 (16.2)	185 (20.8)	40 (4.5)	1 (0.1)	1 (0.1)	208 (23.3)	189 (21.2)	122 (13.7)	1 (0.1)	891 (100.0)	4	575	1,470
PD,HD併用週2 HD(F) (%)	18 (18.0)	29 (29.0)	9 (9.0)		3 (3.0)	16 (16.0)	13 (13.0)	12 (12.0)		100 (100.0)		32	132
PD,HD併用週3 HD(F) (%)													
PD,HD併用週4 HD(F) (%)													
PD,HD併用その他 (%)	9 (18.8)	13 (27.1)	3 (6.3)			4 (8.3)	14 (29.2)	5 (10.4)		48 (100.0)		14	62
合計 (%)	2,165 (37.8)	743 (13.0)	182 (3.2)	13 (0.2)	56 (1.0)	1,429 (25.0)	638 (11.1)	486 (8.5)	11 (0.2)	5,723 (100.0)	10	3,036	8,769
不明 (%)													
記載なし (%)													
総計 (%)	2,165 (37.8)	743 (13.0)	182 (3.2)	13 (0.2)	56 (1.0)	1,429 (25.0)	638 (11.1)	486 (8.5)	11 (0.2)	5,723 (100.0)	10	3,036	8,769

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査