

表 3375 使用透析液の種類 性別（腹膜透析患者）

性別	1.5%液のみ	1.5%液と2.5%液の併用	2.5%液のみ	4.25%液のみ(イコデキストリンなし)	イコデキストリン単独(ブドウ糖使用なし)	1.5%+イコデキストリン	1.5%+2.5%+イコデキストリン	2.5%+イコデキストリン	4.25%液+イコデキストリン	合計	不明	記載なし	総計
男性 (%)	1,351 (36.0)	456 (12.5)	116 (3.2)	6 (0.2)	27 (0.7)	976 (26.7)	408 (11.1)	315 (8.6)	6 (0.2)	3,661 (100.0)	7	2,066 3,095	5,674
女性 (%)	814 (39.5)	287 (13.9)	66 (3.2)	7 (0.3)	29 (1.4)	453 (22.0)	230 (11.2)	171 (8.3)	5 (0.2)	2,062 (100.0)	3	1,030	3,095
合計 (%)	2,165 (37.8)	743 (13.0)	182 (3.2)	13 (0.2)	56 (1.0)	1,429 (25.0)	638 (11.1)	486 (8.5)	11 (0.2)	5,723 (100.0)	10	3,036	8,769
記載なし (%)													
総計 (%)	2,165 (37.8)	743 (13.0)	182 (3.2)	13 (0.2)	56 (1.0)	1,429 (25.0)	638 (11.1)	486 (8.5)	11 (0.2)	5,723 (100.0)	10	3,036	8,769

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査