

表 3376 使用透析液の種類 年齢(歳)別（腹膜透析患者）

年齢	1.5%液のみ	1.5%液と2.5%液の併用	2.5%液のみ	4.25%液のみ（イコデキストリンなし）	イコデキストリン単独（ブドウ糖使用なし）	1.5%+イコデキストリン	1.5%+2.5%+イコデキストリン	2.5%+イコデキストリン	4.25%液+イコデキストリン	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満（%）	14 (23.3)	23 (38.3)	6 (10.0)	4 (6.7)		1 (1.7)		8 (13.3)	4 (6.7)	60 (100.0)		29	89
15歳～（%）	23 (36.5)	10 (15.9)	6 (9.5)	1 (1.6)		10 (15.9)	8 (12.7)	5 (7.9)		63 (100.0)		38	101
30歳～（%）	165 (40.3)	52 (12.7)	14 (3.4)	1 (0.2)	2 (0.5)	89 (21.8)	42 (10.3)	44 (10.8)		409 (100.0)		251	660
45歳～（%）	525 (35.1)	179 (12.0)	56 (3.7)		9 (0.6)	370 (24.7)	207 (13.8)	147 (9.8)	3 (0.2)	1,496 (100.0)	5	819	2,320
60歳～（%）	1,006 (39.8)	332 (13.1)	57 (2.3)	5 (0.2)	17 (0.7)	647 (25.6)	285 (11.3)	177 (7.0)	2 (0.1)	2,528 (100.0)	3	1,292	3,823
75歳～（%）	407 (37.5)	135 (12.4)	36 (3.3)	2 (0.2)	24 (2.2)	292 (26.9)	91 (8.4)	96 (8.8)	2 (0.2)	1,085 (100.0)	1	563	1,649
90歳～（%）	25 (30.5)	12 (14.6)	7 (8.5)		4 (4.9)	20 (24.4)	5 (6.1)	9 (11.0)		82 (100.0)	1	44	127
合計（%）	2,165 (37.8)	743 (13.0)	182 (3.2)	13 (0.2)	56 (1.0)	1,429 (25.0)	638 (11.1)	486 (8.5)	11 (0.2)	5,723 (100.0)	10	3,036	8,769
不明（%）													
記載なし（%）													
総計（%）	2,165 (37.8)	743 (13.0)	182 (3.2)	13 (0.2)	56 (1.0)	1,429 (25.0)	638 (11.1)	486 (8.5)	11 (0.2)	5,723 (100.0)	10	3,036	8,769
平均	63.26	62.25	60.23	43.77	71.86	64.20	61.99	61.47	42.82	62.98	63.60	62.47	62.80
標準偏差	13.78	16.53	19.38	31.96	14.17	13.05	12.68	15.83	30.60	14.49	13.76	14.75	14.58

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査