

表 3377 使用透析液の種類 現在施行中のPD歴(年)別（腹膜透析患者）

現在施行中のPD歴	1.5%液のみ	1.5%液と2.5%液の併用	2.5%液のみ	4.25%液のみ(イコデキストリンなし)	イコデキストリン単独(ブドウ糖使用なし)	1.5%+イコデキストリン	1.5%+2.5%+イコデキストリン	2.5%+イコデキストリン	4.25%液+イコデキストリン	合計	不明	記載なし	総計
1年未満	719	69	35		28	312	51	68	4	1,286	3	76	1,365
(%)	(55.9)	(5.4)	(2.7)		(2.2)	(24.3)	(4.0)	(5.3)	(0.3)	(100.0)			
1年～	448	114	34	1	16	318	100	103	1	1,135	2	33	1,170
(%)	(39.5)	(10.0)	(3.0)	(0.1)	(1.4)	(28.0)	(8.8)	(9.1)	(0.1)	(100.0)			
2年～	540	197	43	3	6	401	160	127	4	1,481	2	34	1,517
(%)	(36.5)	(13.3)	(2.9)	(0.2)	(0.4)	(27.1)	(10.8)	(8.6)	(0.3)	(100.0)			
4年～	222	136	34	2	3	195	118	76	1	787	1	34	822
(%)	(28.2)	(17.3)	(4.3)	(0.3)	(0.4)	(24.8)	(15.0)	(9.7)	(0.1)	(100.0)			
6年～	97	55	7	1	1	94	86	42		383	1	12	396
(%)	(25.3)	(14.4)	(1.8)	(0.3)	(0.3)	(24.5)	(22.5)	(11.0)		(100.0)			
8年～	40	52	8	1	1	32	49	26		209	1	4	214
(%)	(19.1)	(24.9)	(3.8)	(0.5)	(0.5)	(15.3)	(23.4)	(12.4)		(100.0)			
10年～	54	82	16	1		26	48	22	1	250		10	260
(%)	(21.6)	(32.8)	(6.4)	(0.4)		(10.4)	(19.2)	(8.8)	(0.4)	(100.0)			
合計	2,120	705	177	9	55	1,378	612	464	11	5,531	10	203	5,744
(%)	(38.3)	(12.7)	(3.2)	(0.2)	(1.0)	(24.9)	(11.1)	(8.4)	(0.2)	(100.0)			
記載なし	45	38	5	4	1	51	26	22		192		2,833	3,025
(%)	(23.4)	(19.8)	(2.6)	(2.1)	(0.5)	(26.8)	(13.5)	(11.9)		(100.0)			
総計	2,165	743	182	13	56	1,429	638	486	11	5,723	10	3,036	8,769
(%)	(37.8)	(13.0)	(3.2)	(0.2)	(1.0)	(25.0)	(11.1)	(8.5)	(0.2)	(100.0)			
平均	2.48	4.82	3.90	5.18	1.50	2.87	4.64	3.71	3.11	3.26	3.03	2.99	3.25
標準偏差	2.70	4.23	4.08	3.97	1.78	2.44	3.46	3.13	4.23	3.19	3.13	3.40	3.20

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査