

表 3378 使用透析液の種類 原疾患別（腹膜透析患者）

原疾患	1.5%液のみ	1.5%液と2.5%液の併用	2.5%液のみ	4.25%液のみ（イコデキストリンなし）	イコデキストリン単剤（ブドウ糖使用なし）	1.5%+イコデキストリン	1.5%+2.5%+イコデキストリン	2.5%+イコデキストリン	4.25%液+イコデキストリン	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎	732 (%)	282 (14.8)	57 (3.0)	5 (0.3)	16 (0.8)	434 (23.0)	230 (12.2)	131 (6.9)	4 (0.2)	1,881 (100.0)	3	936	2,830
慢性腎盂腎炎	33 (%)	11 (15.9)	1 (1.4)	1 (1.4)		14 (20.3)	6 (8.7)	3 (4.3)		69 (100.0)		28	97
急速進行性糸球体腎炎	14 (%)	7 (33.3)				8 (19.0)	5 (11.9)	7 (16.7)	1 (2.4)	42 (100.0)		24	66
妊婦腎/妊婦中毒症	5 (%)	5 (23.8)	1 (4.8)				5 (23.8)	5 (23.8)		21 (100.0)		6	27
その他の分岐不能の腎炎	16 (%)	7 (34.0)	2 (4.3)			12 (25.5)	7 (14.9)	3 (6.4)		47 (100.0)		31	78
多発性囊胞腎	81 (%)	28 (46.8)	5 (2.9)			36 (20.8)	10 (5.8)	11 (6.4)	2 (1.2)	173 (100.0)		90	263
腎硬化症	296 (%)	80 (40.1)	17 (2.3)	1 (0.1)	7 (0.9)	203 (27.5)	80 (10.8)	54 (7.3)		738 (100.0)		357	1,095
悪性高血圧	30 (%)	7 (41.7)	3 (4.2)			16 (22.2)	11 (15.3)	5 (6.9)		72 (100.0)		35	107
糖尿病性腎症	564 (%)	196 (32.1)	56 (3.2)	1 (0.1)	17 (1.0)	515 (28.3)	205 (11.7)	198 (11.3)	3 (0.2)	1,755 (100.0)	4	1,040	2,799
SLE腎炎	13 (%)	1 (50.0)	1 (3.8)		1 (3.8)	3 (11.5)	3 (11.5)	4 (15.4)		26 (100.0)		20	46
アミロイド腎	2 (%)	2 (22.2)	1 (11.1)			3 (33.3)		1 (11.1)		9 (100.0)		6	15
痛風腎	9 (%)	5 (37.5)	1 (4.2)			5 (20.8)	4 (16.7)			24 (100.0)		8	32
先天性代謝異常による腎不全	3 (%)	3 (25.0)	1 (8.3)			4 (33.3)	1 (8.3)			12 (100.0)	1	4	17
腎・尿路結核	1 (%)					1 (50.0)				2 (100.0)			2
腎・尿路結石	6 (%)	1 (5.9)	2 (11.8)		1 (5.9)	2 (11.8)	1 (5.9)	4 (23.5)		17 (100.0)		4	21
腎・尿路腫瘍	6 (%)		1 (10.0)			2 (20.0)	1 (10.0)			10 (100.0)		4	14
閉塞性尿路障害	10 (%)	3 (55.6)				2 (11.1)	2 (11.1)		1 (5.6)	18 (100.0)		3	21
骨髄腫						2 (40.0)	1 (20.0)	2 (40.0)		5 (100.0)		2	7
腎形成不全	16 (%)	12 (33.3)	9 (18.8)			4 (8.3)	2 (4.2)	5 (10.4)		48 (100.0)		24	72
不明	254 (%)	61 (47.2)	19 (3.5)		7 (1.3)	122 (22.7)	43 (8.0)	32 (5.9)		538 (100.0)	1	303	842
再導入	11 (%)	8 (33.3)				3 (9.1)	6 (18.2)	5 (15.2)		33 (100.0)		22	55
その他	63 (%)	24 (13.9)	5 (2.9)	5 (2.9)	7 (4.0)	38 (22.0)	15 (8.7)	16 (9.2)		173 (100.0)	1	89	263
合計	2,165 (37.8)	743 (13.0)	182 (3.2)	13 (0.2)	56 (1.0)	1,428 (25.0)	638 (11.1)	486 (8.5)	11 (0.2)	5,723 (100.0)	10	3,036	8,769
記載なし													
総計	2,165 (%)	743 (13.0)	182 (3.2)	13 (0.2)	56 (1.0)	1,428 (25.0)	638 (11.1)	486 (8.5)	11 (0.2)	5,723 (100.0)	10	3,036	8,769

数値下のかっこ内は方向向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査