

表 3379 使用透析液の種類 医療機関別（腹膜透析患者）

医療機関	1.5%液のみ	1.5%液と2.5%液の併用	2.5%液のみ	4.25%液のみ（イコデキストリンなし）	イコデキストリン単独（ブドウ糖使用なし）	1.5%+イコデキストリン	1.5%+2.5%+イコデキストリン	2.5%+イコデキストリン	4.25%液+イコデキストリン	合計	不明	記載なし	総計
国公立大学	170	27	8		2	99	42	26		374		289	663
（%）	(45.5)	(7.2)	(2.1)		(0.5)	(26.5)	(11.2)	(7.0)		(100.0)			
私立大学	280	92	22	1	8	153	54	50		660	1	445	1,106
（%）	(42.4)	(13.9)	(3.3)	(0.2)	(1.2)	(23.2)	(8.2)	(7.6)		(100.0)			
国立	79	15	5		1	38	16	10	3	167		55	222
（%）	(47.3)	(9.0)	(3.0)		(0.6)	(22.8)	(9.6)	(6.0)	(1.8)	(100.0)			
県市町村立	409	118	43	5	9	284	130	77	1	1,076	3	494	1,573
（%）	(38.0)	(11.0)	(4.0)	(0.5)	(0.8)	(26.4)	(12.1)	(7.2)	(0.1)	(100.0)			
社会保険	85	26	1		1	79	8	4		204		318	522
（%）	(41.7)	(12.7)	(0.5)		(0.5)	(38.7)	(3.9)	(2.0)		(100.0)			
厚生連	118	69	13	4	6	107	34	49		400		160	560
（%）	(29.5)	(17.3)	(3.3)	(1.0)	(1.5)	(26.8)	(8.5)	(12.3)		(100.0)			
その他公的	363	101	23		9	252	88	59		895		464	1,359
（%）	(40.6)	(11.3)	(2.6)		(1.0)	(28.2)	(9.8)	(6.6)		(100.0)			
私立総合	90	64	20		1	37	44	47	1	304		59	363
（%）	(29.6)	(21.1)	(6.6)		(0.3)	(12.2)	(14.5)	(15.5)	(0.3)	(100.0)			
私立	406	164	34	2	12	263	140	119	4	1,144	4	551	1,699
（%）	(35.5)	(14.3)	(3.0)	(0.2)	(1.0)	(23.0)	(12.2)	(10.4)	(0.3)	(100.0)			
私立診療所	165	67	13	1	7	117	82	45	2	499	2	201	702
（%）	(33.1)	(13.4)	(2.6)	(0.2)	(1.4)	(23.4)	(16.4)	(9.0)	(0.4)	(100.0)			
総計	2,165	743	182	13	56	1,429	638	486	11	5,723	10	3,036	8,769
（%）	(37.8)	(13.0)	(3.2)	(0.2)	(1.0)	(25.0)	(11.1)	(8.5)	(0.2)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査